



GOLTIX® 70 WDG

Herbisit (Yabancıot İlacı)
Suda Dağılılabilen Granül (WDG)
%70 Metamitron içerir



1 KG



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44

www.adama.com/turkey

facebook.com/adamaturkiye

[adama_turkiye](https://instagram.com/adama_turkiye)

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.



GOLTIX® 70 WDG

**Yabancı Otlara Karşı
Ezber Bozan Mücadele**

İlk uygulamadan itibaren gözle görülür etki!



Dinle • Anla • Paylaş

ADAMA.COM/TURKEY

GOLTİX® 70 WDG

GOLTİX® 70 WDG şeker pancarında tek yıllık geniş yapraklı otlara karşı, çıkış öncesi ve çıkış sonrası kullanılan geniş spektrumlu bir herbisittir.

AVANTAJLARI:

- Kolay uygulanır.
- Toprakten ve yaprakten etkilidir.
- Toz ve köpürme yapmaz

NASIL ÇALIŞIR:

GOLTİX® 70 WDG içerdiği aktif madde sayesinde yaprakten ve toprakten etkisini ortaya koyar. Duyarlı yabancı otların büyümesi engellenir ve ölüme sürüklenir.

GOLTİX® 70 WDG %70 Metamitron içeren suda dağılılabilen granül (WDG) formülasyonunda bir herbisittir. Metamitron kökten ve yaprakten emilimi ile harekete geçer.



Yabancı otlar, ilaç ile muntazam kaplandığı takdirde ot kontrolünde iyi bir başarı elde edilir. GOLTİX® 70 WDG dönümde 20-40 litre su ile kullanılmalıdır.

Herbisitin etkili olabilmesi için toprak nemi oldukça önemlidir. Eğer uygulamalar kuru toprağa yapılırsa herbisitin etkisi uygulamadan sonra meydana gelecek olan yağışlardan sonra görülmeye başlar.



GOLTİX® 70 WDG 500-700 g/da

GOLTİX® 70 WDG 600 g/da



GOLTİX® 70 WDG İLE TAM KONTROL

- ✓ Geniş spektrumlu, mükemmel aktif
- ✓ Hedef yabancı otlara karşı yaprakten ve toprakten etki
- ✓ İlk uygulamadan itibaren gözle görülür etki



Sirken
(*Chenopodium album*)



Yabani semizotu
(*Portulaca sp.*)



Yabani hardal
(*Sinapis arvensis*)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı ot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Şekerpancarı	Kazayağı sirken (<i>Chenopodium sp.</i>)	500 - 700 g/da pre-emergence (Çıkış öncesi)
	Horoz ibiği (<i>Amaranthus sp.</i>)	
	Ballıbaba (<i>Lamium sp.</i>)	
	Papatya (<i>Matricaria sp.</i>)	
	Yabani semizotu (<i>Portulaca sp.</i>)	
	Yavşan otu (<i>Veronica sp.</i>)	
	Tavşan bıyığı (<i>Poa annua</i>)	
	Yabani hardal (<i>Sinapsis arvensis</i>)	
	Yabani turp (<i>Raphanus sp.</i>)	
	Kazayağı sirken (<i>Chenopodium album</i>)	
Yabani hardal (<i>Sinapsis arvensis</i>)		
Horoz ibiği (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
Fare kulağı (<i>Anagallis arvensis</i>)		
Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>)		
Karapazı (<i>Atriplex patula</i>)		
Yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>)		

