

İMAL TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI:  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 15.03.2021 ve 11838

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR**

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
Buğday	Çoban değneği ( <i>Polygonum aviculare</i> ) Tarla köpek papatyası ( <i>Anthemis arvensis</i> ) İnce delice ( <i>Lolium rigidum</i> ) Sü�ürge otu ( <i>Descurainia sophia</i> ) Gelincik ( <i>Papaver rhoeas</i> ) Adi yavşan otu ( <i>Veronica hederifolia</i> ) Kuşotu ( <i>Stellaria media</i> ) Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	525 ml/da (Çıkış sonrası)
	Sü�ürge otu ( <i>Descurainia sophia</i> ) Kokarot ( <i>Bifora radians</i> ) Adi yavşan otu ( <i>Veronica hederifolia</i> ) Tarla sarmaşığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )	525 ml/da (Çıkış öncesi)
Arpa	Sü�ürge otu ( <i>Descurainia sophia</i> ) Kokarot ( <i>Bifora radians</i> ) Taşkesen otu ( <i>Buglossoides arvensis</i> ) Adi yavşan otu ( <i>Veronica hederifolia</i> ) Yatık gökbaş ( <i>Centaurea deprassa</i> ) Doğu tarla hezeranı ( <i>Consolida orientalis</i> )	525 ml/da (Çıkış öncesi)

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

**KALİBRASYON:**

Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# MADUREZ® 425 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP C2, F1 HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

**400 g/l Chlorotoluron + 25 g/l Diflufenican**

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**GENEL BİLGİLER:** Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse kullanım talimatlarını veya güvenlik bilgi formunu gösterin). İlk yardımcı: kendilerinin korunmalarına dikkat!

**SOLUMA:** Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

**YUTMA:** Ağzı iyice yıkayın. Bol su için. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**CİLTLE TEMAS:** Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

**GÖZLERLE TEMAS:** Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

NET MİKTARI:  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL)

İÇİNDEKİLER Chlorotoluron, Diflufenican



UYARI KELİMESİ: Dikkat

**ZARARLILIK İFADELERİ**

**H351** Kansere yol açma şüphesi var.  
**H361d** Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.  
**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.  
**EUH208** 1,2-Benzisothiazolin-3- on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

**ÖNLEM İFADELERİ**

**P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  
**P201** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.  
**P280** Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.  
**P501** İçindekileri/kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.  
**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Rüzgârlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kullandıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz, boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulama amacı ile hazırlanan karışım bekletilmeden kullanılmalıdır.
- Boş gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

MADUREZ® 425 SC kontakt etkili bir bitki koruma ürünü olup, yabancı otların yapraklarına değme yoluyla ve kısmen de kökleri vasıtası ile bünyeye alınarak etki eder. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımı durur. Böylece yabancı otların buğday ve arpa bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Tarla pülverizatörü ile uygulama yapılmalıdır. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm olmalıdır. Uygulamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya öğleden sonra yapılmalıdır. Sıcak, soğuk ve kuraklık, aşırı yağıştan kaynaklanan stres koşullarında uygulama ertelenmelidir.

### EKİM-DİKİM MÜNAVEBESİ:

Hasat sonrası toprak derin işlenerek diğer ürünler ekilebilir.

### DİRENÇ YÖNETİMİ:

MADUREZ® 425 SC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup C2 ve F1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için MADUREZ® 425 SC 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2 ve F1 harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışıma ihtiyaç duyulması halinde bir ön karışım testi yapılması önerilir.

®ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# MADUREZ® 425 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	C2, F1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	--------	-----------------------------

**400 g/l Chlorotoluron + 25 g/l Diflufenican**

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisini altındadır.

### ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

**Adama Agan Ltd.**

P.O. Box 262, Ashdod, 7710201 İsrail

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

**ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Kazımdirik Mah. 296. Sok. No:8 İç Kapı No:515

Bornova/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40