



İMİAL TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ :  
ŞARJ NUMARASI :  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 16.07.2004 / 4759

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat arasındaki süre
*Bağ	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	50 ml/100 L su	7 gün
	Ölükol ( <i>Phomopsis viticola</i> )	125 ml/100 L su	7 gün
Kiraz	Sert Çekirdekli Meyvelerde Çiçek Monilyası ( <i>Monilinia laxa</i> )	125 ml/100 L su	7 gün
Kayısı	Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak delen(çil) ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> )	125 ml/100 L su	10 gün
Elma	Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	125 ml/100 L su	21 gün
	Elma Depo Hastalıkları <i>Penicillium</i> spp., <i>Monilinia fructigena</i> <i>Botrytis cinerea</i>	125 ml/100 L su	21 gün
Armut	Karaleke ( <i>Venturia pirina</i> )	125 ml/100 L su	21 gün
Turunçgil	Kahverengi Leke ( <i>Alternaria alternaria</i> )	250 ml/100 L su	14 gün
Nar	Kahverengi Leke ( <i>Alternaria alternata</i> )	125 ml/100 L su	14 gün
Muz (Sera)	Muzda <i>Mycosphaerella</i> Yaprak Lekesi (Sigatoka) Hastalığı ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> , <i>Mycosphaerella musicola</i> )	150 ml/100 L su	7 gün
Zeytin	Halkalı Leke ( <i>Spilocaea oleagina</i> )	125 ml/100 L su	14 gün
Domates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	150 ml/100 L su	7 gün
Hıyar	Kabakgillerde Mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	100 ml/100 L su	7 gün
Kornişon			
Patates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	150 ml/da	7 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# MASTERCOP®

Süsansiyon Konsantre (SC)

GRUP	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	-------------------------

65,82 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Yutulduğunda bulantı, kusma, baş ağrısı, mide ağrısı, tahrişe neden olur.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:** Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**SOLUMA:** Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

**YUTMA:** Ağzı çalkalayın. Bol su için. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**ÇİLTLE TEMAS:** Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

**GÖZLERLE TEMAS:** Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Semptomatik tedavi uygulanır. Özel bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

NET MİKTARI :  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL) :

İÇİNDEKİLER	65,82 g/l Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Sülfat
-------------	---



**UYARI KELİMESİ: TEHLİKE**

**ZARARLILIK İFADELERİ**

**H318** Ciddi göz hasarına yol açar.

**H335** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ**

**P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

**P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.

**P270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

**P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

**P501** İçindekileri/kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf ediniz.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz, boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# MASTERCOP®

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	----	-------------------------

65,82 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat

**Zeytinde Halkalı Leke:** Marmara Bölgesi: 1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.

Ege Bölgesi: 1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

Akdeniz Bölgesi:1.uygulama: Hasattan sonra, 2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.

**Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):** 1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra.

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde). Kayıslarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. İlaçlama yapılmalıdır.

**Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kiraz):** 1.uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte). 2.uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-%100 çiçekte).

**Narda Kahverengi Leke:** 1.uygulama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında. 2.uygulama: Taç yaprakları döküldüğünde. 3.uygulama: Meyveler yarı büyüklüğüne gelince yapılır.

**Muzda(Sera) Mycosphaerella Yaprak Lekesi (Sigatoka) Hastalığı:** 1. Uygulama: Üçüncü veya dördüncü yaprakta koyu kahverengi lekeler veya çizgiler şeklinde hastalığın ilk belirtisi görüldüğünde yapılır.

2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ilacın etki süresi, çevre koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak yapılır.

**Hıyar, Kornişonda Mildiyö Hastalığı:** Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtisi görüldüğünde başlanır, 10 gün ara ile tekrarlanır.

**Elma Depo Hastalıkları:** Hasattan 21 gün önce tek ilaçlama yapılır.

**Patates Mildiyösü:** Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

## DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MASTERCOP isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için MASTERCOP'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) fungusitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

## KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışıma ihtiyaç duyulması halinde bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

©ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.