

İMAL TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI:  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 20.05.1991 ve 2439

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu ve Zamanı
Ayçiçeği	Farekulağı ( <i>Aragallis arvensis</i> ) Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Kırmızı çiçekli ballıbaba ( <i>Lamium purpureum</i> ) Çobanedeğneği ( <i>Polygonum aviculare</i> ) Yabani turp ( <i>Raphanus raphanistrum</i> ) Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Kuş otu ( <i>Stellaria media</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> ) Yabani fiğ ( <i>Vicia spp.</i> )	300 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi
Havuç	Horoz İbiği ( <i>Amaranthus spp</i> ) Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Çobanedeğneği ( <i>Polygonum aviculare</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> ) Yabani turp ( <i>Raphanus raphanistrum</i> )	250 ml/da Ekimden hemen sonra havuç toprak yüzüne çıkmadan önce
Patates	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Yeşil horozibği ( <i>Amaranthus viridis</i> ) Çoban çantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Hakiki şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> ) Gelincik ( <i>Papaver rhoeas</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )	200-250 ml/da Hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır. Dikimden sonra en geç 5 gün içinde uygulanmalıdır.
Nohut	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Yatık sirken ( <i>Chenopodium vulvaria</i> ) Dikenli yabani marul ( <i>Lactuca serriola</i> ) Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	250 ml/da Ekimden hemen sonra çıkış öncesi
Mercimek	Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Arap baklası ( <i>Vaccaria pyramidata</i> ) Yapışkan ot ( <i>Galium aparine</i> ) Kekre ( <i>Acroptilon repens</i> )	250 ml/da Ekim sonrası çıkış öncesi



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# RACER 25<sup>®</sup> EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	F1	HERBİSİT (Yabancı ot İlacı)
------	----	-----------------------------

250 g/l Flurochloridone

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Genel belirtiler başlangıçta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:** Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**SOLUMA:** Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

**YUTMA:** Kusturmayın. Ağzı çalkalayın. Bol su için. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**ÇİLTLE TEMAS:** Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

**GÖZLERLE TEMAS:** Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

**ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:** Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” TEL: 114**

NET MİKTARI:  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

İÇİNDEKİLER	Flurochloridone Hidrokarbonlar, C9, Aromatik Sikloheksanon
-------------	--

**ZARARLILIK İFADELERİ**

**H226** Alevlenir sıvı ve buhar.

**H304** Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

**H317** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

**H319** Ciddi göz tahrişine yol açar.

**H335** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

**H361d** Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**EUH066** Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

**ÖNLEM İFADELERİ**

**P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

**P201** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

**P210** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.

**P243** Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

**P261** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

**P280** Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

**P501** İçindekileri / kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# RACER 25<sup>®</sup> EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	F1	HERBİSİT (Yabancı ot İlacı)
------	----	-----------------------------

## 250 g/l Flurochloridone

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilalı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### İLALAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilalama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm paraların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Racer 25 EC, ayieđi ve havuta ekimden hemen sonra (1-2 gün içerisinde), patateste dikimden sonra en geç 5 gün içerisinde toprak yüzeyine, mercimek ekiminden sonra, mercimek ve yabancı otlar toprak yüzeyine çıkmadan önce uygulanmalıdır. Racer 25 EC'den en yüksek etkiyi almak için, ekimden veya dikimden önce toprak keseksiz olarak hazırlanmalıdır. Racer 25 EC çıkmış yabancı otlara etkili olmadığından uygulama sırasında tarlada çıkmış yabancı ot bulunmamalıdır. Racer 25 EC uygulandıktan sonra uygulama yapılmış tabakanın bozulmaması için, zorunlu olmadıka toprak işlenmemelidir. Patateste geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi olarak, hafif topraklarda düşük (200 ml/da), ağır topraklarda yüksek doz (250 ml/da) kullanılmalıdır. Uygulama yelpaze şeklinde püskürtme yapan (tee-jet) meme ile 2.0-2.5 bar basınla yapılmalıdır. Uygulama rüzgârsız havada yapılır. Uygulama yapılırken aynı yerden üst üste geçilmemelidir. Havu tohumlarının çimlenmesi için sulama gerekli ise, uygulamadan hemen sonra yağmurlama sulama yapılmalıdır.

### DİREN İLE İLGİLİ BİLGİ:

RACER 25 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, diren gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle diren gelişimini geciktirmek için RACER 25 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gerektiđi durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F1 harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diđer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eđer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Kullandıktan sonra boş ila ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz, ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Soğan, Domates, Tüütün, Kabakgiller** (Kabak, Hıyar, Karpuz ve Kavun) ve **Lahanagiller** (Lahana, Karnabahar ve Turp) **ilaca karşı çok hassas olduklarından RACER 25 EC kullanılan tarlaya 12 ay sonra ekilmelidir.**
- Boşalan gıda ve iecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir, çieklenme dönemi kullanmayınız.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir deđişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün deđildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluđu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır.

### ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

Adama Agan Ltd.

P.O. Box 262,

Ashdod, 7710201 İsrail

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti

Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.

No:3/0806 Konak/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40