

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 13/01/2014 ve 9441

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BITKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Elma karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	65 ml /100 L su	28 gün
Kayısı	Çiçek monilyası (<i>Monilinia=Sclerotinia laxa</i>)	50 ml / 100 L su	7 gün
Şeftali	Çiçek monilyası (<i>Monilinia=Sclerotinia laxa</i>)	50 ml/100 L su	21 gün
Kiraz	Çiçek monilyası (<i>Monilinia=Sclerotinia laxa</i>) Meyve monilyası (Mumya) (<i>Monilinia fructigena</i>)	50 ml/100 L su	7 gün
Bağ*	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/100 L su	7 gün
Patıcan (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Domates (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Biber (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml/100 L su	7 gün
Ceviz	Ceviz antraknozu (<i>Gnomonia leptostyla</i>)	50 ml/100 L su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

QUALY® 300 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	D1:9	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	-------------------------

300 g/l Cyprodinil

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BITKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Gözleri tahriş edebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alın. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Solunması halinde: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

Yutulması halinde: Ağzı iyice yıkayın. Bol su için. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Ciltle teması halinde: Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

Gözlerle teması halinde: Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulayın. Yutulması halinde, gastrik lavaj ve aktif kömür uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER	Cyprodinil
-------------	------------



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH208 Cyprodinil, Propanoik asit, 2-hidroksi-2-etilheksil ester içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501 İçeriği/ kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesi: 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürününün etki süresi dikkate alınarak (10-14 gün ara ile) uygulanır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı, Şeftali, Kiraz):

1.uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-%10 çiçekte)

2.uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-%100 çiçekte) yapılır.

Kirazda meyve monilyası: Meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır. Uygulama ağacın her yerini kaplayacak şekilde yapılmalıdır.

Bağda kurşuni küf:

1. uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında.

2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürününün etki süresi dikkate alınarak (10-15 gün ara ile) yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Domates (sera), Patlıcan (sera), Biber (sera) kurşuni küf: Hastalıkla kimyasal mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Ceviz antraknozu: Hastalığın her yıl şiddetli olarak seyrettiği yerlerde kimyasal mücadele gerekir.

1. uygulama: Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakların kedi kulağı olduğu dönemde

2. uygulama: Yapraklardaki yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde

3. uygulama: Meyvelerin fındık kadar olduğu dönemde

4. ve diğer uygulamalar: Yağışlı geçen yerlerde kullanılan fungisitlerin etki süresi dikkate alınarak ve enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece tekrarlanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

QUALY 300 EC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup D1:9 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için QUALY 300 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1:9 harici) fungisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

QUALY® 300 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUP	D1:9	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	-------------------------

300 g/l Cyprodinil

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Bitki koruma ürününün kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisidir.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

Adama Makhteshim Ltd.

P.O. Box 60, Beer-Sheva 8410001 İsrail

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.

No:3/0806 Konak/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40