

İMAL TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI:  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:11.12.2017 ve 10999

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Şekerpancarı	<b>Kırmızı köklü tilkikuyruğu</b> ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) <b>Sirken</b> ( <i>Chenopodium album</i> ) <b>Yabancı hardal</b> ( <i>Sinapis arvensis</i> )	<b>Çıkış öncesi</b>  <b>400 ml/da</b>	<b>90 gün</b>
	<b>Sirken</b> ( <i>Chenopodium album</i> ) <b>Yabancı kazayağı</b> ( <i>Chenopodium murale</i> ) <b>Şeytan elması</b> ( <i>Datura stramonium</i> )	<b>Çıkış sonrası</b>  <b>400 ml/da</b>	<b>90 gün</b>

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Daha önce kullanılmış olan ilaç artıkları uygulama aletinden iyice temizlenir. Uygulama aletinin deposuna yarı miktarda su konur. Tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılarak depoya atılır. Karıştırıcı çalışırken kalan su depoya ilave edilir. Hazırlanan karışım hemen kullanılmalıdır. Kısa iş molaları ardından ilaçlamaya geçmeden önce yaklaşık 10 dakika karıştırıcı çalıştıktan sonra uygulamaya devam edilir. Yabancı otlar, ilaç ile muntazam kaplandığı takdirde ot kontrolünde iyi bir başarı elde edilir. Dekara kullanılacak su 20-40 l olmalı, yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# GOLTIX® 700 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	C1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	----	-----------------------------

700 g/l METAMİTRON

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

**Zehirlenme Belirtileri:** Mide bulantısı, kusma, ishal gibi genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**Genel Bilgiler:** Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse kullanım talimatlarını veya güvenlik bilgi formunu gösterin). İlk yardımcı: kendilerinin korunmalarına dikkat!

**Soluma:** Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

**Yutma:** Kusturmayın. Ağız çalkalayın. Bolca su için. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**Ciltle Temas:** Kirliliği tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

**Gözlerle Temas:** Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**Antidodu Ve Tedavisi:** Özel bir antidodu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

NET MİKTARI:  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER	Metamitron
-------------	------------



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ

**H302** Yutulması halinde zararlıdır.

**H411** Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

**EUH208** 5-kloro-2-metil-4-izotiyazolin-3-on ve 2-metil-4-izotiyazolin-3-one içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

#### ÖNLEM İFADELERİ

**P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

**P270** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

**P280** Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

**P501** İçindekileri/kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Rüzgârlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kullandıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz, boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulama amacı ile hazırlanan karışım bekletilmeden kullanılmalıdır.
- Boş gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Normal şartlar altında tüm şeker pancarı çeşitleri GOLTİX 700 SC' a çok iyi tolerans (uyum) gösterir. Şeker pancarı stres altında iken herbisitlere karşı çok hassastır. Sürekli yağın yağmurlar, büyüme geriliği, ani sıcaklık değişimleri, daha önce atılan bitki koruma ürünleri, yüksek ışık, ilaçlama sırasındaki aşırı yüksek ve aşırı düşük ortam sıcaklığı, kuvvetli rüzgâr, devamlı düşük ısılar, böcek ya da mantar zararı gibi diğer faktörler şekerpancarını strese sokabilir ve kotiledonlar zarar görebilir, yeterince büyüme gerçekleşmez. Bu durumlarda herbisit kullanımını durumu daha da kötüleştirinceği için stres altındaki şekerpancarına herbisit kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

### Kullanım şartı:

Yüksek kireç içerikli, tuzluluk oranı yüksek ve sürüm yapılmamış veya kireç tabanlı topraklarda GOLTİX® 700 SC uygulamalarından kaçınılır.

### Yabancı otlara çıkış öncesi uygulaması:

GOLTİX® 700 SC uygulaması toprağın nemli, düzgün sürülmüş kesek ve aşırı bitki kalıntısı olmayan ve yabancı otların çıkışının başlamadığı yerlerde yapılmalıdır. Uygulama ekim sonrası yapılmalıdır. Atım aleti karıştırıcı, orta ve yüksek basınçlı flat fan atım ucun olan ve hedef alana yeknesak uygulama yapabilecek seviyede olmalıdır. Çıkış öncesinde önerilen su miktarı dönüme 20-40 l'dir. Yabancı otların çimlenmesinden önce uygulama yapılan alanda 5 gün içerisinde en az 10 mm yağmur düşmesi veya yağmurlama sulama sistemi ile sulanması ilacın toprakta daha iyi çözünmesi açısından önem arz eder. Gerekli olduğu durumlarda yabancı otların çıkışı öncesi tatbik edilen GOLTİX® 700 SC'den sonra tekrar çıkış sonrası uygulamalar gerekebilir.

### Yabancı otlara çıkış sonrası uygulaması:

GOLTİX® 700 SC yabancı otların 2-6 yaprak döneminde çıkışı sonrası kullanılır. Uygulama sırasında yabancı otların aktif gelişimi devam etmeli ve herhangi bir stres koşulu altında olmaması gerekir. Atım aleti karıştırıcı, orta ve yüksek basınçlı flat fan atım ucu olan ve hedef alana yeknesak uygulama yapabilecek seviyede olmalıdır. Önerilen su miktarı dönüme 20 l'dir. Uygulama sırasında şeker pancarı bitkisi stres koşulları altında gelişmemesi ve en az 2 gerçek yaprak döneminde olması gerekmektedir. Yabancı otların çıkışı devam ettiği durumlarda GOLTİX® 700 SC tekrar uygulanması gerekebilir. GOLTİX® 700 SC, mineral yağ bazlı bir yayıcı yapıştırıcı ile kullanılabilir.

GOLTİX® 700 SC şeker pancarında tek yıllık yabancı otların kontrolü için hem kök hem de yaprak yoluyla alınabilen, kontak ve sistemik özelliklere sahip, çok yönlü, güvenli seçici bir herbisittir. GOLTİX® 700 SC yabancı otların çıkışı öncesi ve sonrası kullanılan bir herbisittir. Herbisitin etkili olabilmesi için toprak nemi oldukça önemlidir. Şayet uygulamalar kuru toprağa yapılırsa herbisitin etkisi uygulamadan sonra meydana gelecek olan yağışlardan sonra görülmeye başlar.

### EKİM-DİKİM MÜNAVEBESİ:

GOLTİX® 700 SC uygulamasından şeker pancarı haricinde ancak 16 hafta sonra ekim-dikim işlemleri yapılabilir. Bu 16 haftalık periyodun sonunda derin sürüm yapılarak ekim dikim yapılabilir.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

GOLTİX 700 SC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup C1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için GOLTİX 700 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde toplam 3 uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1 harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

®ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# GOLTİX® 700 SC

Süsansiyon Konsantre (SC)

GRUP	C1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	----	-----------------------------

700 g/l METAMİTRON

## DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ürünün, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır.

## ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

Adama Agan Ltd.  
Northern Industrial Zone P.O. Box 262,  
Ashdod, 7710201 İsrail

## RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA Turkey Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Kazımdirik mah. 296. Sok. No:8 İç Kapı No:515  
Bornova/İZMİR  
Tel: +90 232 462 61 40