

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 26.02.2021/11819

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	35 ml/da Larva ve Ergin	28 gün
	Tütün thrips (<i>Thrips tabaci</i>)	35 ml/da Nimf ve Ergin	
	Bitki tahtakuruları (<i>Creontiades pallidus</i> <i>Lygus spp.</i>)	40 ml/da Nimf ve Ergin	
Bağ*	Turunçgil unlubiti (<i>Planococcus citri</i>)	40 ml/100 L su Nimf ve Ergin	21 gün
Şekerpancarı	Şekerpancarı pireleri (<i>Chaetocnema spp.</i>)	40 ml/da Ergin	14 gün
Nar	Turunçgil unlubiti (<i>Planococcus citri</i>)	40 ml/100 L su Larva ve Ergin	14 gün
Zeytin	Zeytin kabuklubiti (<i>Parlatoria olea</i>)	35 ml/100 L su Larva	14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TRIVOR®

Disperse Olabilen Konsantre (DC)

GRUP	4A	7C	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	----	--------------------------

186 g/l Acetamiprid + 124 g/l Pyriproxyfen

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ ‘üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel bilgiler: Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse kul lanım talimatlarını veya güvenlik bilgi formunu gösterin). İlk yardımcı: kendilerinin korunmalarına dikkat!

Soluma: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

Yutma: Kusturmayın. Ağzı iyice yıkayın. Bolca su için. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

Ciltle Temas: Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktor çağırın.

Gözlerle Temas: Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

İlk yardımcının korunması: Gerekli gibi kişisel koruyucu ekipman kullanın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):

İÇİNDEKİLER	Acetamiprid, Pyriproxyfen
-------------	---------------------------

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız.
- Bitki koruma ürünü mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Dökülmesi halinde üzerinde kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TRIVOR®

Disperse olabilen Konsantre (DC)

GRUP	4A	7C	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
------	----	----	--------------------------

186 g/l Acetamiprid + 124 g/l Pyriproxyfen

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta tütün beyazsineğine karşı: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğunda mücadeleyle başlanmalıdır.

Pamukta tütün thripsine karşı: Pamuk fidesi 1-3 gerçek yapraklı dönemde iken zararlı popülasyonu, yaprak başına 1 adet (nimf veya ergin) düzeyine geldiğinde yaprak bitine karşı mücadele yapmak gerekir.

Pamukta bitki tahtakurularına karşı: Deneme yerinde deneme öncesi zararlının popülasyon seviyesi 100 generatif organda (tarak, çiçek ve küçük koza) en az 10 adet veya 100 atrapta 15 adet (nimf+ergin) olmalıdır. Tek uygulama yapılmalıdır.

Bağda turuncgil unlubitine karşı: Unlubite karşı mücadele iki dönemde yapılır. **Birinci dönem:** Asmanın gövdesindeki kabuklarda ıslaklık görüldüğü ve Unlubitin yeşil aksama doğru yürümeye başladığı dönemdir. Bu dönemde taneler yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız Unlubitin görüldüğü asmalar ilaçlanmalıdır.

İkinci dönem: Unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelere tatlı su yürüttüğü dönemdir. Birinci dönemde bulaşıklık çok seyrek olarak birkaç asmada bulunmuşsa sadece ikinci dönemde ilaçlama yapılmalıdır. Birinci dönemde unlubit asmaların çoğunda saptanmışsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde, her iki dönemde de uygulama yapılmalıdır.

Şekerpancarı pirelerine karşı: Deneme öncesi deneme yerinde zararlı popülasyon seviyesi kontrol edilir, bitki başına en az 5 ergin bulunmalıdır. Tek ilaçlama yeterlidir.

Narda turuncgil unlubitine karşı: Uygulama zamanını tespit amacıyla mayıs ayı ilk yarısından itibaren gövde ve ana dallar kışlamış ergin ve yumurta açısından kontrol edilerek %10 ağaç bulaşıklığı durumunda ilk ilaçlama yapılır. %10 ağaç bulaşıklığının olduğu dönemdeki meyve bulaşıklık oranı kaydedilir. Temmuz sonu – ekim ayları arasında meyve bulaşıklık oranı %10 ve üzerinde ise ikinci bir uygulama yapılır. İki ilaçlama yeterlidir.

Zeytin kabuklubitine karşı: Bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz önüne alınmalıdır. Parazitlenme oranı %50'den yüksek olduğu bahçelerde kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Uygulama, yumurtaların %50'sinin açıldığı ve birinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu zaman yaprak ve meyvelerin ıslanabileceği şekilde bir defa yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

TRIVOR® isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 4A;7C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **TRIVOR®** ile aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı bir etki mekanizmasına sahip (Grup 4A;7C harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışıma ihtiyaç duyulması halinde bir ön karışım testi yapılması önerilir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde oluşabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

Adama Makhteshim Ltd.

P.O. Box 60.Industrial Zone Beer Sheva

8410001, İsrail

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kazımdirik mah. 296. Sok. No:8 İç Kapı No: 515

Bornova/İZMİR

Tel: 0232 462 61 40