




TRIVOR®



**TRIVOR® ile
Mahsülünüz Parlar**

ADAMA Kalitesiyle!

TRIVOR® ADAMA'nın marka tescilli ticari ürünüdür.



Dinle • Anla • Paylaş

ADAMA.COM/TURKEY



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Kazımdırık Mah. Ankara Cad. 296 Sok. No:8
Folkart Time 1. Blok Kat:5 D: 515, 35100,
Bornova / İZMİR
www.adama.com/turkey
facebook.com/adamaturkiye
[adama_turkiye](https://instagram.com/adama_turkiye)

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.



INSEKTİSİT

TRIVOR®

TRIVOR®

TRIVOR® ile Mahsülünüz Parlar

TRIVOR®, litrede 186 g Acetamiprid ve 124 g Pyriproxyfen içeren bir insektisittir.

TRIVOR®, birbirini tamamlayan farklı iki aktif madde içerir. Yüksek teknoloji ile formüle edilmiş bu iki aktif madde birbiri ile uyum içinde çalışarak yüksek standartlı bir çözüm ortaya koyar.

Acetamiprid, kontak etkili ve aynı zamanda mide zehiridir. Bitkide sistemik hareket eder ve translaminar aktivite gösterir. Zararlı böcekte asetilkolin enziminin antagonisti olarak çalışır ve böceğin merkezi sinir sistemini etkileyerek önce felç olmasına sonra ise ölmesine neden olur.

Pyriproxyfen ise böcek gelişim düzenleyici olarak faaliyet gösterir. Böceğin yaşamsal gelişim periyot ve faaliyetlerini engelleyerek etki gösterir, zararlının ölümüne neden olur.



AVANTAJLAR

- Rezidüel etkisiyle uzun süre koruma.
- Zararlı mücadelesinde kolay ve etkin çözüm sağlar.
- Çift aktif madde ile iki farklı etki mekanizması içerir.
- Farklı ve yüksek formülasyon teknolojisine sahiptir.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	35 ml/da Larva ve Ergin	28 gün
	Tütün thripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	35 ml/da Nimf ve Ergin	
	Bitki tahtakuruları (<i>Creontiades pallidus</i> <i>Lygus spp.</i>)	40 ml/da Nimf ve Ergin	
Bağ*	Turuncgil unlu biti (<i>Planococcus citri</i>)	40 ml/100 L su Nimf ve Ergin	14 gün
Şekerpancarı	Şekerpancarı pireleri (<i>Chaetocnema spp.</i>)	40 ml/da Ergin	14 gün
Nar	Turuncgil unlu biti (<i>Planococcus citri</i>)	40 ml/100 L su Larva ve Ergin	14 gün
Zeytin	Zeytin kabuklubiti (<i>Parlatoria olea</i>)	35 ml/100 L su Larva	14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

