

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 25/01/1996 ve 2884

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Kimyon	Kazayağı (<i>C. opulifolium</i> , <i>C. botrys</i>)	200 ml/da Kültür bitkisi: 3-4 çatal döneminde Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç dönemde
	Yapışkan Nakil (<i>Silene conoidea</i>)	
	Muhabetotu (<i>Reseda lutea</i>)	
	Pıtrak (<i>Turgenia latifolia</i>)	
	Boynuzlu Yoğurtotu (<i>Galium tricorne</i>)	
	Düğün Çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>)	
Soğan (Arpacık)	Taşkesen Otu (<i>Lithospermum arvense</i>)	150 ml/da Kültür Bitkisi: 2-4 yapraklı dönem Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç dönemde
	Y. Süpürge Otu (<i>Sisymbrium officinale</i>)	
	Soda Otu (<i>Salsola kali</i>)	
	Yabancı Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	
	Kazayağı (<i>Chenopodium album</i>)	
	Gönül Hardal (<i>Myagrum perfoliatum</i>),	
	Horozibiği (<i>Amaranthus retroflexus</i>),	
	Sarmaşık Çoban Değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)	
	Çoban Değneği (<i>P. aviculare</i>)	
	Pıtrak (<i>Xanthium spinosum</i>)	
Anason	Fare Kulağı (<i>Anagallis arvensis</i>)	175 ml/da Kültür bitkisi: Ekimden sonra Yabancı otlar: Çıkış öncesi
	Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)	
	Tatula (<i>Datura stramonium</i>)	
	Yavşan Otu (<i>Veronica sp.</i>)	
Havuç	Horozibiği (<i>Amaranthus retroflexus</i>),	150 ml/da Kültür bitkisi: Çıkış sonrası Yabancı otlar: Çıkış öncesi
	Kazayağı (<i>Chenopodium album</i>),	
	Sarmaşık Çoban Değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)	
	Yabancı Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>),	
	Darican (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
Havuç	Horozibiği (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	175 ml/da Kültür bitkisi: Ekimden sonra Yabancı otlar: Çıkış öncesi
	Kazayağı (<i>Chenopodium album</i>)	
	Sarmaşık Çoban Değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)	
	Yabancı Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	
	Darican (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
Havuç	Horozibiği (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	150 ml/da Kültür bitkisi: Çıkış sonra Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç dönemde
	Kazayağı (<i>Chenopodium album</i>)	
	Sarmaşık Çoban Değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)	
	Yabancı Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	
	Yabancı Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AFALON® DISPERSİYON

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	C2	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
------	----	----------------------------

450 g/l LİNURON

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse kullanım talimatlarını veya güvenlik bilgi formunu gösterin). İlk yardımcı: kendilerinin korunmalarına dikkat!

SOLUMA: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

YUTMA: Ağzı iyice yıkayın. Bol su için. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

CİLTLE TEMAS: Kirliliği tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

GÖZLERLE TEMAS: Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER	Linuron
-------------	---------



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H360Df Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH208 1,2-Benzisothiazolin-3-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one. İçerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

P501 İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

▪ Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

▪ Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

▪ Rüzgârlı havalarda ilaçlama yapmayınız.

▪ Komşu kültür bitkisine bulaşmamasına dikkat ediniz.

▪ Tıkanmış adaptörleri ağızla üfleyerek açmayınız. Fırça ile temizleyiniz.

▪ İlaçlamada kullanılan uygulama aletini tekrar kullanmadan önce sabun ve sodalı su ile birkaç defa yıkayınız.

▪ Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.

▪ Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.

▪ Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ÇIKIŞ ÖNCESİ İLAÇLAMA: Ekimden sonra 1-2 gün içerisinde yapılır. İlaçlama sırasında toprak tezeksiz olmalıdır. İlaçlı alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Killi ve organik maddece zengin topraklarda ilaç daha yüksek dozlarda atılabilir. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ilacı kullanırken dikkatli olunmalı ve düşük doz tercih edilmelidir.

ÇIKIŞ SONRASI İLAÇLAMA: Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. Toprakta birikimi söz konusu değildir. Birkaç ay içinde toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanır. Bundan dolayı müteakip sene ekilen kültür bitkisinde zararlı olmaz.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

AFALON® DİSPERSİYON isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup C2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için AFALON DİSPERSİYON'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2 hariç) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AFALON® DİSPERSİYON

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	C2	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
------	----	----------------------------

450 g/l LİNURON

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisidir.

ÜRETİCİ FİRMA:

Adama Agriculture Espana, S.A.
C/Mendez Alvaro, 20
Madrid 28045 İspanya

ÜRETİM TESİSİ:

Adama Agran Ltd.
P.O. Box 262, Ashdod, 7710201 İsrail

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Çınarlı Mahallesi İslam Kerimov Caddesi No:1
Martı Tower Kat:7 D:703 Konak/İzmir
Tel: 0232 462 61 40