



TREK-P®

Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Süspo Emülsiyon (SE)
270 g / l Tertbutylazine ve 64 g / l Pendimethalin içerir.



5 LT



ADAMA



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44

www.adama.com/turkey

facebook.com/adamaturkiye

[adama_turkiye](https://instagram.com/adama_turkiye)

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.



ADAMA

TREK-P®

En Başında Yabancı Ot
Kontrolü



HERBİSİT


Dinle • Anla • Paylaş

ADAMA.COM/TURKEY

TREK-P®

TREK-P® mısır tarlalarında bir çok tek yıllık geniş yapraklı yabancı otları kontrol eden, çıkış öncesi (pre-emergence) ve erken çıkış sonrası (post-emergence) kullanılan bir herbisittir. İçeriğinde bulunan Pendimethalin; Dinitroalin grubuna bağlı hücre bölünmesini engellemek sureti ile etkili olan bir herbisittir. Terbutylazine; Triazine grubuna ait fotosentezde fotosistem II sistemini engellemek sureti ile etkili olan bir herbisittir. Çıkış öncesi ve çıkış sonrası yabancı otları kontrol eder. **TREK-P®** gelişmiş süspo-emülsiyon formülasyonu sayesinde, sıvı içerisinden süspanse halde bulunan katı parçacıklar ve küçük likit kürecikler ile yabancı otların wax tabakasına kolayca nüfus eder. **EKİM VE ÇIKIŞ ÖNCESİ HERBİSİTLERİN NEMLİ TOPRAĞA UYGULANMASI YA DA UYGULAMADAN SONRA YAĞMURLA YA DA SULAMAYLA AKTİVE EDİLMESİ GEREKLİDİR.**

KULLANIM DÖNEMİ



Kırmızı köklü tilki kuyruğu
(*Amaranthus retroflexus*)



Sirken
(*Chenopodium album*)



Semizotu
(*Portulaca oleracea*)



Şeytan elması
(*Datura stramonium*)

KULLANMA ŞEKLİ:

Gece don tehlikesi altında olan tarlalar da ve çiğ ya da ıslak koşullarda kullanılmamalıdır. Don ya da aşırı ıslaklıktan dolayı zayıflamış, zarar görmüş ya da seyrek alanlarda ve bitki stres altında olduğu dönemlerde ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında toprağın nemli olduğundan emin olunuz. Uygulamadan sonra uzun süre kuru hava şartları ilacın etkinliğinin azalmasına sebep olabilir. Aşırı taşlı ve çakıllı topraklara uygulamayınız. Su birikmiş veya su birikmesine meyilli tarlalarda uygulamayınız. Uygulamadan sonra toprak işleme yapmayınız. Organik madde oranı %10' nun üstünde olan topraklarda uygulamayınız.

UYGULAMA:

TREK-P® orta ve yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ve sırt pülverizatörü ile dekara 20-40 litre su kullanılarak uygulanmalıdır. İlaçlı mahlulün homojen dağılması için düz yelpaze meme kullanılması tavsiye edilir. Çıkış öncesi kullanılacak ise 2-4 atmosfer basınçla toprak yüzeyi iyi bir şekilde, eğer çıkış sonrası kullanılacak ise bitkiler ilaçlı mahlül ile iyice kaplanmalıdır. Çalışmaya ara verirsiniz dinlenme sonrasında çalışma aletini yeniden karıştırınız. Artan ilaçlama sıvılarını zorunlu olmadıkça tekrar kullanmayınız.



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Mısır*	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)	300 ml / da Çıkış öncesi, mısır ekildikten sonra, yabancıotlar çıkmadan önce kullanılır.
	Sürünücü horozibiği (<i>Amaranthus blitoides</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	250 ml / da Çıkış sonrası, mısırın 3-5 yapraklı döneminde ve yabancıotların 0-4 yapraklı erken döneminde kullanılır.
	Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)	300 ml / da Çıkış sonrası, mısırın 3-5 yapraklı döneminde ve yabancıotların 0-4 yapraklı erken döneminde kullanılır.