



MOKKA®

Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Emülsiyon Konsantre (EC)
360 g/l 2,4-D Asit (543 g/l 2,4 D EHE eşdeğer) + 90 g/l
Fluroxypyr (129 g/l Fluroxypyrmeptyl'e eşdeğer) içerir.



1 LT

5 LT




ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44
www.adama.com/turkey
facebook.com/adamaturkiye
adama_turkiye

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.



MOKKA®



**Temiz, Daha
Temiz!**

Buğdayda geniş yapraklı yabancı
otlara karşı hızlı çözüm!



ADAMA.COM/TURKEY

MOKKA®

Buğdayda geniş yapraklı yabancı otlara karşı
HIZLI ÇÖZÜM!

NASIL ÇALIŞIR?

Mokka'nın içeriğinde bulunan her iki aktif madde 4. grupta yer alır. Yabancı otların yapraklarının bükülmesine ve çukurlaşmasına neden olarak, gelişimlerini engeller. 2 ila 10 gün içerisinde yabancı otların ölmesine neden olur.

AVANTAJLARI:

- Hem kış hem de bahar buğdaylarında görülen bir çok geniş yapraklı ot mücadelesinde yüksek etkinlik gösterir.
- Çiftçiye uygulama zamanı konusunda esneklik sağlar.
- Dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan herbisit ürünleri ile uyumludur, karışım halinde kullanılabilir.*
- Uygulamadan sonra çok hızlı bir şekilde etkileri görülmeye başlanır.
- Daha sonra ekilen mahsüle zarar vermez.

*Mutlaka ufak alanlarda ön karışım testi yapılmalıdır.



Buğdayda ot mücadelesinde yüksek etkinlik gösterir.



Uygulama zamanında esneklik sağlar.



Herbisit ürünleri ile uyumludur.



Hızlı bir şekilde etkileri görülür.



Sonra ekilen mahsüle zarar vermez.



Mokka, 2 aktif maddenin mükemmel karışımı ile buğday yetiştiriciliğinde mücadelesi zorlu geniş yapraklı yabancı otları kontrol eden bir herbisittir. Bir çok dar yapraklı herbisit ürünü ile karışabilirliği olan Mokka'nın içeriğinde 360 g/l 2,4-D Asit ile 90 g/l Fluroxypyr bulunur.



Yabani hardal
(*Sinapis arvensis*)



Çobançantası
(*Capsella bursa-pastoris*)



Hakiki papatya
(*Matricaria chamomilla*)



Gelincik
(*Papaver rhoeas*)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancıot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Adi Yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>)	125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde	-
	Gökbaş (<i>Centaurea cyanus</i>)		
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
	Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)		
	Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>)		
	Dil kanatan (<i>Galium aparine</i>)		
	Kandamlası (<i>Adonis sp.</i>)		
	Kokarot (<i>Bifora radians</i>)		
Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>)			