



1Kg



Etiket için tarayınız.



Feinzin®



Yabancı ot kontrolünde çözüm sizin elinizde!

Teknik Müdür
Mustafa Orçun Ürün: 0 530 962 8664

Ürün Müdürü
Mehmet Manavoğlu: 0 532 473 7920

Adana Bölge Müdürü
İbrahim Gültekin: 0 532 654 6475

Mersin Bölge Müdürü
Bekir Işık: 0 530 049 1722

Doğu Marmara Bölge Müdürü
Bünyamin Burak Pelen: 0 533 611 6979

Batı Marmara Bölge Müdürü
Metin Aydın: 0 530 049 1720

Trakya Bölge Müdürü
Levent Başayan: 0 530 049 1719

Batı Akdeniz Bölge Müdürü
Ömer Özgün Özokçu: 0 530 049 1721

Ege Bölge Müdürü
Serdar Mağden: 0 530 962 8661

GAP Bölge Müdürü
İsmail Abca: 0 530 353 9083

İç Anadolu Bölge Müdürü
Salim Sarı: 0 530 049 1723

Karadeniz Bölge Müdürü
Alpay Köroğlu: 0533 644 6055

Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız

ADAMA
TÜRKİYE



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mh. İslam Kerimov Cad. No:1 Martı Tower
A Blok K:7 D:704 Konak-İZMİR-TURKEY
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44
www.adama.com

ADAMA
TÜRKİYE



Feinzin® patates, domates ve soyada yabancı ot kontrolünde kullanılan üstün etkili bir herbisittir. Hem çıkış öncesi hem de çıkış sonrası kullanılabilir.

Feinzin®'in içeriğinde bulunan metribuzin triazin kimyasal grubuna bağlı seçici bir aktif maddedir. Metribuzin çıkış öncesi ve çıkış sonrası görülen geniş ve dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde hem yaprağa hem de toprağa uygulanarak kullanılabilir. Toprak uygulamasından sonra aktif madde öncelikle köklerden alınır ve ksilem aracılığıyla yapraklara yayılır. Metribuzin fotosentezi durdurarak etki eder.

Metribuzinin aynı zamanda toprakta kalıcı etkisi vardır. Bu nedenle **Feinzin®**'in toprakta yarılanma (parçalanma) ömrü oldukça uzundur ve toprak işlenmesi yapılmadığı takdirde çıkabilecek yeni otlara karşıda koruma sağlar.



Semizotu
(*Portulaca oleracea*)



Kırmızı köklü filki kuyruğu
(*Amaranthus retroflexus*)



Kaz Ayağı
(*Chenopodium Album*)



Hardal
(*Sinapis arvensis*)



Bambul otu
(*Chrozophora tinctoria*)

AVANTAJLARI:

- Benzersiz molekül yapısı sayesinde yabancı otları yok eder, bitkiye zarar vermez. Seçici (selektif) özelliği sayesinde sadece yabancı otlara etkilidir.
- **Feinzin®** hem köklerden hem de yapraklardan etkili olduğu için çıkış öncesi ve çıkış sonrası kullanılabilir.
- Geniş spektrumlu etkisi ve düşük kullanım dozu ile ekonomiktir.
- Kullanıldığı bitkilerde kalıntı riski yoktur.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ :

Gerekli miktar ilaç, önce az bir su ile bir kap veya pülverizatör deposu içerisinde bulamaç haline getirilir. Sonra gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir ve püskürtülmeye hazır hale getirilir.

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ:



Patates: Çıkış öncesi olarak: Patates dikiminden sonra doğrudan toprak yüzeyine uygulanır, başka bir işlem yapılmaz. Hafif topraklarda 50-75 g/da, ağır topraklarda 75-100 g/da. Çıkış sonrası olarak: Patatesler 5-10 cm boyda iken 50-75 g/da dozda kullanılır.



Domates: Fide ile domates yetiştiriciliğinde: Şaşırtmadan birkaç gün sonra fideler tutunca ve yabancı otların çoğu toprak yüzüne çıkınca 50-75 g/da dozda kullanılır. Doğrudan tohumla domates yetiştiriciliğinde:

A) Çıkış öncesi: Domates fideleri toprak yüzüne çıkmadan 30 g/da dozda uygulanır.

B) Çıkış sonrası: Domates fidelerinin 6-7 yapraklı olduğu dönemde 40-70 g/da dozda uygulanır.



Soya: Ekimden hemen sonra uygulanır, başka bir işlem yapılmaz.



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Patates	Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Bambul Otu (<i>Heliotropium europaeum</i>) Sarmaşık Çoban Değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>) Acı Ot (<i>Solanum dulcamara</i>) Fare Kulağı (<i>Veronica sp.</i>) Senelik Köpek Lahanası (<i>Mercurialis annua</i>) Kaz Ayağı (Sirken) (<i>Chenopodium album</i>) Büyük Pıtrak (<i>Xanthium macrocarpum</i>) Demir Dikeni (<i>Tribulus terrestris</i>)	50 – 75 g / da	42
Domates	Yapışkan Ot (<i>Setaria spp.</i>) Çatal Otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Semiz Otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Horoz İbiği (<i>Amaranthus spp.</i>) Kaz Ayağı (Sirken) (<i>Chenopodium album</i>) Demir Dikeni (<i>Tribulus terrestris</i>)	50 – 75 g / da	42
Soya	Semiz Otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Alçak Sütlegeni (<i>Euphorbia prostrata</i>) Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Bayır Turpu (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	50 g / da (Ekimden hemen sonra)	42

