

İMAL TARİHİ:  
SON KULLANMA TARİHİ:  
ŞARJ NUMARASI:  
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 18/04/2014 ve 9638

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	Uygulama Zamanı
Mısır*	<b>Domuz Pitrağı</b> ( <i>Xanthium strumarium</i> ) <b>Şeytan Elması</b> ( <i>Datura stramonium</i> ) <b>Semizotu</b> ( <i>Portulaca oleracea</i> ) <b>Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu</b> ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) <b>Gece Sefası</b> ( <i>Ipomoea sagittata</i> ) <b>Köpek Üzümü</b> ( <i>Solanum nigrum</i> )	150 ml/da	Çıkış sonrası, mısırın 4-6 yapraklı döneminde ve yabancı otların 2-4 yapraklı erken döneminde kullanılır.

\*Şeker ve Cin mısırında kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# BROMOTRİL® T

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	C1 VE C3	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
------	----------	----------------------------

**300 g/l Terbutylazine ve 200 g/l Bromoxynil**

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme gibi genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:** Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**SOLUMA:** Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

**YUTMA:** Kusturmayın. Ağzı çalkalayın. Bol su için. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

**CİLTLE TEMAS:** Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

**GÖZLERLE TEMAS:** Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.

**ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:** Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

**ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

NET MİKTARI:  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER	Terbutylazine Bromoxynil
-------------	-----------------------------



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ

- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H332 Solunması halinde zararlıdır.
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
- P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P501 İçindekileri / kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BROMOTRİL T'nin uygulaması esnasında yabancı otlar çıkmış olmalıdır. Mücadeleden en iyi sonucu alabilmek için yabancıotların 2-4 yapraklı olduğu genç dönemde ilaçlama yapılmalıdır. Don ya da aşırı ıslaklıktan dolayı zayıflamış, zarar görmüş ya da seyrek alanlarda ve bitki stres altında olduğu dönemlerde ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Gece don tehlikesi altında olan tarlalarda ve çiğ ya da ıslak koşullarda kullanılmamalıdır. BROMOTRİL T her ne kadar kültür bitkisi tarafından iyi tolere edilse de herbisit kuru ve sıcak havalarda uygulanmalıdır. Normalden az gelişmiş mum tabakası – kütikula (bu durum genellikle uzun süre yağış almış alanlarda söz konusu olur) genç ve hızlı büyüyen mısır bitkilerinde zaman zaman yapraklarda renk açılmasına sebep olabilir, fakat genelde bu zarar geçicidir. İlaçlamadan hemen sonra yağış olursa herbisit etkisi azalabilir. BROMOTRİL T uygulanmış alanların herhangi bir sebepten dolayı erken bozulması durumunda mısır ve sudan otu yetiştirilebilir. BROMOTRİL T uygulanan tarlaya mısır kültür bitkisinden sonra bölge için yetiştirilen tüm bitkiler ekilebilir. Uygun olmayan hava koşullarında özellikle kışlık buğday olmak üzere ekim nöbetindeki bitkilerde zarar oluşabilir.

BROMOTRİL T mısır tarlalarında birçok tek yıllık geniş yapraklı yabancı otları kontrol eden, çıkış sonrası (post-emergence) bir yabancı ot ilacıdır. BROMOTRİL T farklı iki etki mekanizmasına sahip Bromoxynil ve Terbutylazine aktif maddelerinin karışımı bir herbisittir. Bromoxynil yapraklardan hemen alınır ve yaprak hücrelerinde fotosenteze müdahale etmek sureti ile etkili olur. Buna karşılık Terbutylazine ağırlıklı olarak köklerden alınır ve yabancı otları çıkış esnasında kontrol eder. Bitkilerde elektron transportu diğer enzimatik faaliyetleri bloke etmek suretiyle fotosentezi olumsuz etkiler. Her iki madde ideal bir şekilde birbirinin etkinliğini destekler. BROMOTRİL T hormon içermemektedir. Bu nedenle etrafında hormona duyarlı kültür bitkileri bulunan (pancar, koza, şerbetçi otu, vb) mısır tarlalarında rahatlıkla uygulanır. BROMOTRİL T gerek ani etkisi gerekse topraktaki rezidü etkisi sayesinde bazı dar yapraklı yabancı otlara karşı da etkilidir.

## DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BROMOTRİL T isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup C1 ve Grup C3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için BROMOTRİL T'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1 ve Grup C3 harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

## KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

BROMOTRİL T'nin diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

# BROMOTRİL® T

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	C1 VE C3	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
------	----------	----------------------------

**300 g/l Terbutylazine ve 200 g/l Bromoxynil**

## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- İlaçlama esnasında ilacın bitişik ürünlere sürüklenmemesine dikkat ediniz.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- İlaçlanan yerde hayvan otlatmayınız, ot almayınız.

## DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

## FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisidir.

## ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

Adama Ağan Ltd.  
P.O. Box 262,  
Ashdod, 7710201 İsrail

## RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti  
Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.  
No:3/0806 Konak/İZMİR  
Tel: 0232 462 61 40