



Belvedere® Forte

Herbisit (Yabancıot İlacı)
Süspo-Emülsiyon (SE)
Phenmedipham ve 100 g/l Desmedipham içerir.



1 LT



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44

www.adama.com/turkey

facebook.com/adamaturkiye

[adama_turkiye](https://instagram.com/adama_turkiye)

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.



Belvedere® Forte

Şeker Pancarı için,
mükemmel formülasyon



Dinle • Anla • Paylaş

ADAMA.COM/TURKEY

Belvedere® Forte

Şeker pancarı güneşin doğuşundan itibaren yabancı otlar ile su, ışık ve gübre savaşına girer. Ülkemizde şeker pancarı tarlalarında bir çok yabancı ot türüne rastlanır. Şeker pancarında otların kontrolünde başarıya ulaşmak için kullanılan herbisitlerin aktif maddelerinin oranı ve kullanım dozlarının dikkatle ayarlanması gerekir.

AVANTAJLARI:

- Kolay uygulanır
- Toprakta ve yaprakta etkilidir
SE formülasyonu sayesinde şeker pancarı için güvenlidir.
- Yabancı ot kontrolünde etkinliği artar.
- 3 farklı etki mekanizması ile şeker pancarını yabancı otlara karşı başarıyla korur.
- Ethofumesate, Phenmedipham ve Desmedipham'ın ideal karışımı ile daha iyi bir yabancı ot kontrolü sağlar.

Belvedere® Forte birleşiminde üç aktif madde içerir

SE formülasyona sahip herbisitler şeker pancarı için yenilikçi ve gelişmiş bir uygulamaya sahiptir. **Belvedere® Forte** temel su bazlı suspo - emülsiyon formülasyonu ile sıvı içinde suspans halde bulunan katı parçacıklar ve küçük likit kürecikler sayesinde yabancı otların mumsu tabakasından kolayca içeri girer.



Yabani hardal
(*Sinapis arvensis*)




Yabani marul
(*Lactuca serriola*)



Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(*Amaranthus retroflexus*)



Sirken
(*Chenopodium album*)



İlacın Uygulamaya Hazırlanması ve Kullanma Şekli: Daha önce kullanılmış olan ilaç artıklarını ilaçlama aletinden iyice temizleyin. İlaçlama aletinin deposuna yarı miktarda su konur. Tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılarak depoya atılır. Karıştırıcı çalışırken kalan su depoya ilave edilir. Hazırlanan karışım hemen kullanılmalıdır. Kısa iş molaları ardından ilaçlamaya geçmeden önce yaklaşık 10 dakika karıştırıcı çalıştıktan sonra ilaçlamaya devam edilir.

Yabancı otlar, ilaç ile muntazam kaplandığı takdirde ot kontrolünde iyi bir başarı elde edilir. **Belvedere® Forte** dönüme 20-40 litre su ile verilmelidir.

Belvedere® Forte bölünmüş doz (split) uygulaması ile ardışık olarak 7-10 gün ara ile 3 uygulama şeklinde kullanılır. 1. uygulamadan sonra ot çıkışı olmasa dahi 2. ve 3. uygulamalara devam edilmelidir.

Normal şartlar altında tüm şeker pancarı çeşitleri **Belvedere® Forte** 'ye çok iyi tolerans (uyum) gösterir. Pancar stres altında iken herbisitlere karşı çok hassastır. Sürekli yağın yağmurlardan sonra büyüme geriliği, ani sıcaklık değişimleri, daha önce atılan bitki koruma ürünleri, yüksek ışık, ilaçlama sırasındaki ortam sıcaklığı, kuvvetli rüzgâr, devamlı düşük ısılar, böcek ya da mantar zararı gibi diğer faktörler şeker pancarını strese sokabilir ve kotiledonlar zarar görebilir, yeterince büyüme gerçekleşmez. Bu durumlarda herbisit kullanımı durumu daha da kötüleştireceği için stres altındaki şeker pancarına herbisit kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Hava sıcaklığı 25°C'nin üzerindeyse ilaçlama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancıot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Şeker pancarı	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	1. Uygulama 100 ml/da Çıkış sonrası Şeker pancarı tam kotiledon aşamasında Yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde başlanılır.
	Yabani hardal (<i>Sinapsis arvensis</i>)	2. Uygulama 100 ml/da İlk ilaçlamadan 7-10 gün sonra yaşayan veya tekrar çıkan yabancı otları kontrol etmek için kullanılır.
	Sürünücü horozibiği (<i>Amaranthus blitoides</i>)	3. Uygulama 100 ml/da İkinci ilaçlamadan 7-10 gün sonra, yaşayan veya tekrar çıkan yabancı otları kontrol etmek için kullanılır.
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	