



ADAMA



Scudero

СКЛАДОВА ВРОЖАЮ



РОСЛИНА ВІДДЯЧИТЬ



МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС

ADAMA працює разом із фермерами, агрономами, дистриб'юторами та сільськогосподарськими спільнотами, щоб досягти успіху в їх бізнесі та за його межами – від посіву до продажу. Компанія має понад 70-річний досвід роботи та бездоганну репутацію завдяки якості продукції та увазі до потреб своїх клієнтів.

ТУРБОТА ПРО РЕЗУЛЬТАТ

Ми прагнемо до створення простих рішень у сільському господарстві, пропонуючи фермерам продукти й послуги, які забезпечують ефективне вирощування сільськогосподарських культур для отримання максимального результату. Саме тому ADAMA пропонує своїм клієнтам лінійку добрив для позакореневого застосування – **Scudero[®]**.

НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ВРОЖАЮ

Позакореневе підживлення – важливий інструмент для ефективного управління продуктивністю високоврожайних посівів. Саме тому лінійка добрив **Scudero**® є однією зі складових для отримання високого врожаю.

Лінійка добрив **Scudero**® стала втіленням досконалості на базі багаторічного досвіду та наукового потенціалу, який має компанія **ADAMA**.

Спираючись на останні наукові досягнення у сфері позакореневого живлення рослин та сучасні технології, компанії **ADAMA** вдалося досягти ефекту активної дії на рослини (Active Action Effect).

Active Action Effect –

це стабільний та високий результат застосування добрив **Scudero**® завдяки:



СКУДЕРО^{GREEN} 6-25-25

Збалансоване живлення – запорука високого врожаю

Рідке комплексне добриво, що забезпечує збалансоване живлення широкого спектру сільськогосподарських культур протягом вегетації.

Рекомендується для позакореневого підживлення широкого спектра сільськогосподарських культур протягом вегетації. Забезпечує збалансоване живлення культур особливо при недостатньому кореновому живленні, що сприяє оптимальному фізіологічному стану рослин і підтримує ростові процеси.

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує збалансоване живлення рослин.
- Поліпшує розвиток кореневої системи на початку вегетації рослин.
- Підтримує ростові процеси при недостатньому кореновому живленні.
- Сприяє підвищенню стресостійкості рослин.
- Усі елементи живлення повністю доступні для рослин.
- Добре змішується із 33Р.

Вміст доступних елементів живлення, г/л:

Азот (N)	60,0
Фосфор (P ₂ O ₅)	250,0
Калій (K ₂ O)	250,0
Бор (B)	0,15
Залізо (Fe)*	0,36
Мідь (Cu)*	0,08
Марганець (Mn)*	0,22
Цинк (Zn)*	0,16
Молібден (Mo)	0,05

* Мікроелементи, хелатовані ЕДТА.



ADAMA

Культура	Період (фаза) обробки	Норма, л/га	Кратність обробок*
Зернові	Кущення – вихід у трубку	1,0 – 4,0	1 – 3
Кукурудза	5 – 12-й листок		
Соняшник	4 – 6 справжніх листка – бутонізація		
Соя	2 – 3-й трійчастий листок – початок формування бобів		
Ріпак	Формування розетки – стеблування	1,0 – 4,0	1 – 4
Плодові, овочеві**	Протягом вегетації		

* Мінімальний інтервал між обробками – 7 днів.

** Досвід використання в інших країнах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:



Рекомендована норма витрати робочого розчину для польових та овочевих культур ≥ 150 л/га, для багаторічних насаджень ≥ 800 л/га.



Робочий розчин необхідно використати протягом кількох годин після приготування.



Застосовувати за температури повітря не вище 25°C і за швидкості вітру не вище 5 м/с!



Добриво сумісне з більшістю ЗЗР. Проте при першому застосуванні рекомендується провести тест на сумісність у невеликій кількості.



СКУДЕРО^{GREEN} МУЛЬТІ

Вагомий внесок у майбутній урожай

Комплексне добриво для поліпшення азотного обміну, білкового синтезу та інтенсивності фотосинтезу рослин. Рекомендується для позакореневого підживлення широкого спектра культур у період інтенсивного росту та в критичні періоди розвитку.

Комплекс мікроелементів із підвищеним вмістом молібдену та цинку забезпечує покращення азотного, фосфорного та вуглеводного обмінів, що підвищує інтенсивність фотосинтезу та сприяє кращому засвоєнню елементів живлення з ґрунту.

Запобігає та усуває нестачу мікроелементів, що сприяє оптимальному фізіологічному стану рослин та посилює їх ростові процеси.

ПЕРЕВАГИ:

- Широкий спектр елементів живлення.
- Підвищений вміст Мо та Zn.
- Підвищує інтенсивність фотосинтезу.
- Покращує засвоєння елементів живлення з ґрунту.
- Поліпшує азотний обмін та білковий синтез рослин.
- Добре сумісний із засобами захисту рослин.

Вміст доступних елементів живлення, г/л:

Азот (N)	123,1
Фосфор (P ₂ O ₅)	36,9
Калій (K ₂ O)	24,6
Бор (B)	3,69
Мідь (Cu)	2,46
Марганець (Mn)	2,46
Цинк (Zn)	36,9
Молібден (Mo)	1,23



ADAMA

Культура	Період (фаза) обробки	Норма, л/га	Кратність обробок*	
Зернові	Кущення – колосіння	1,0 – 3,0	1 – 3	
Кукурудза	5 – 12-й листок			
Соняшник	4 – 6 справжніх листка – бутонізація			
Соя, горох	Розгалуження стебла – початок формування бобів			
Ріпак	Початок видовження стебла – кінець бутонізації			
Цукровий буряк	П'ятий листок – змикання міжрядь	1,0 – 4,0	1 – 4	
Плодові, виноград	Протягом вегетації			
Овочі, картопля				

* Мінімальний інтервал між обробками – 7 днів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:



Рекомендована норма витрати робочого розчину для польових та овочевих культур – ≥ 150 л/га, для багаторічних насаджень – ≥ 800 л/га.



Робочий розчин необхідно використати протягом кількох годин після приготування.



Застосовувати за температури повітря не вище 25 °C та швидкості вітру не вище 5 м/с!



Добриво сумісне з більшістю ЗЗР. Проте при першому застосуванні рекомендується провести тест на сумісність у невеликій кількості.

СКУДЕРО^{GREEN} БОРОН

Запорука якісного запліднення

Добриво з високим вмістом бору в сполучі з етаноламіном. Рекомендується для поліпшення запліднення та кращого формування клітинних стінок, що сприяє кращому росту та розвитку меристемних (твірних) тканин, кореневої системи, генеративних органів.

Бор доволі малорухливий у рослині, тому його позакореневе застосування є необхідним заходом при вирощуванні чутливих до нестачі бору культур та з метою покращення запліднення.

Особливістю СКУДЕРО БОРОН є те, що бор міститься в комплексі з органічною сполукою – етаноламіном. Саме за рахунок такого поєднання підвищується ефективність засвоєння бору крізь листову поверхню та його рухливість рослиною. Це в найкоротший термін забезпечує рослини бором та гарантує високий урожай.

ПЕРЕВАГИ:

- Швидке проникнення бору крізь кутикулу листка.
- Покращує міцність клітинних стінок.
- Забезпечення високої мобільності бору в рослині.
- Позитивно впливає на ріст кореневої системи та розвиток точки росту.
- Покращує процес цвітіння та запліднення.
- Добре сумісний із засобами захисту рослин.

Вміст доступних елементів живлення, г/л:

Бор (В) 150,0



ADAMA

Культура	Період (фаза) обробки	Норма, л/га	Кратність обробок*
Озимий та ярий ріпак	4 – 9 листків (фаза осінньої розетки)		
	Стеблуння	1,0 – 2,0	1 – 3
	Бутонізація – цвітіння		
Соняшник	6 – 8 листків – фаза зірочки. Фаза зірочки – початок цвітіння	1,0 – 2,0	1 – 2
Соя	2 – 3 трійчастий листок – цвітіння	0,5 – 1,5	1 – 3
Цукровий буряк	П'ятий листок – змикання міжрядь	1,0 – 2,0	1 – 3
Плодові	Розпускання плодових бруньок	1,0	
	Одразу після цвітіння	1,0	1 – 3
	Після збору врожаю (не пізніше ніж за 4 тижні до початку листопаду)	1,0 – 2,0	
Виноград	5 – 6 листків – до початку цвітіння. Після збору врожаю	1,0 – 2,0	1 – 2
Овочеві	Бутонізація – цвітіння	1,0 – 2,0	1 – 2

* Мінімальний інтервал між обробками – 7 днів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:



Рекомендована норма витрати робочого розчину для польових та овочевих культур – ≥ 150 л/га, для багаторічних насаджень – ≥ 800 л/га.



Робочий розчин необхідно використати протягом кількох годин після приготування.



Застосовувати за температури повітря не вище 25°C та швидкості вітру не вище 5 м/с!



Добриво сумісне з більшістю ЗЗР. Проте при першому застосуванні рекомендується провести тест на сумісність у невеликій кількості.

СКУДЕРО^{SCUDERO} СаВ

Отримання якісного та високого врожаю

Добриво з високим вмістом кальцію з додаванням бору. Забезпечує швидке постачання кальцію рослинам, покращення якості продукції та її транспортельності, зменшення абортивності бобових тощо.

Наявність бору у складі добрива сприяє кращому засвоєнню кальцію.

Роль кальцію в рослинах не обмежується лише забезпеченням якісної продукції. Він відіграє важливу роль у фотосинтезі, пересуванні вуглеводів рослиною, в процесах засвоєння азоту, стимулює активність бульбочкових бактерій. Кальцій разом із бором запобігає абортивності квіток бобових та покращує їх запліднення.

ПЕРЕВАГИ:

- Високий вміст кальцію та наявність бору.
- Бор у складі добрива поліпшує засвоєння кальцію рослиною.
- Підвищує активність бульбочкових бактерій.
- Запобігає абортивності генеративних органів бобових культур.
- Покращує процес цвітіння та запліднення бобових культур.

Вміст доступних елементів живлення, г/л:

Кальцій (Са)	137,5
як (СаО)	184,2
Бор (В)	24,8



ADAMA

Культура	Період (фаза) обробки	Норма, л/га	Кратність обробок*
Соя	Бутонізація – початок формування бобів	2,0 – 3,0	1 – 2
Плодові	Кінець цвітіння – ріст плодів	3,0 – 5,0	3 – 6
Виноград	Формування ягід – змикання ягід у гроні	3,0 – 5,0	3 – 6
Овочеві	Ріст плодів	3,0 – 5,0	3 – 6

* Мінімальний інтервал між обробками – 7 днів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:



Рекомендована норма витрати робочого розчину для польових та овочевих культур – ≥ 150 л/га, для багаторічних насаджень – ≥ 800 л/га.



Робочий розчин необхідно використати протягом кількох годин після приготування.



Застосовувати за температури повітря не вище 25°C та швидкості вітру не вище 5 м/с!



Добриво сумісне з більшістю ЗЗР. Проте при першому застосуванні рекомендується провести тест на сумісність у невеликій кількості.



Не змішувати з добривами, які містять сірку або фосфор.



СКУДЕРО[®] CoMo

Розкрий потенціал бобових культур!

Добриво для обробки насіння та позакореневого підживлення бобових культур із метою покращення життєдіяльності та азотфіксації бульбочкових бактерій.

СКУДЕРО CoMo є вдалим поєднанням мікроелементів, які вкрай необхідні для ефективної азотфіксації бульбочкових бактерій та забезпечення високого потенціалу урожайності бобових культур.

Молібден входить до складу нітрогенази, ферменту, який виконує головну роль у фіксації атмосферного азоту. За наявності кобальту процес фіксації азоту проходить активніше. Кобальт підвищує вміст леггемоглобіну, який забезпечує киснем енергетичні центри бульбочок для фіксації азоту.

ПЕРЕВАГИ:

- Поєднання найважливіших мікроелементів для азотфіксації.
- Поліпшує розвиток та життєдіяльність бульбочкових бактерій.
- Підвищує здатність бульбочок до фіксації атмосферного азоту.
- Рекомендується як для позакореневого підживлення рослин, так і для обробки насіння.
- Добре сумісний із протруйниками насіння, інокулянтами та іншими агрохімікатами.

Вміст доступних елементів живлення, г/л:

Кобальт (Co)	14,5
Молібден (Mo)	145,4

Культура	Період (фаза) обробки	Норма, л/т, л/га	Кратність обробок*
Соя, горох, нут та інші бобові культури	Обробка насіння	1,0 – 2,0	1
	Розгалуження стебла – початок цвітіння	0,2 – 0,4	1 – 2

* Мінімальний інтервал між обробками – 10 днів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:



Рекомендована норма робочого розчину при обробці насіння – 10 л/т. Робочий розчин готують безпосередньо перед обробкою насіння.



Для отримання максимального ефекту від обробки насіння рекомендується роздільне застосування СКУДЕРО СоМо та інокулянту.



Рекомендована норма витрати робочого розчину при позакореновому застосуванні – ≥ 150 л/га.



Позакореневе підживлення проводити за температури повітря не вище 25 °C та швидкості вітру не вище 5 м/с!



Добриво сумісне з більшістю ЗЗР. Проте при першому застосуванні рекомендується провести тест на сумісність у невеликій кількості.



СКУДЕРО[®] Zn+

Найефективніше забезпечення цинком

Позакореневе добриво з високим вмістом легкодоступного цинку. Рекомендується для усунення та профілактики дефіциту цинку у сільськогосподарських та садових культур.

СКУДЕРО Zn+ виготовлене на основі нітрату цинку, який є найефективнішим джерелом цинку при позакореновому застосуванні. Рекомендується для усунення та профілактики дефіциту цинку у широкого спектру культур. У рослинах цинк входить до складу ферментів, які беруть участь у фотосинтезі, синтезі білків і ауксинів. Цинк підвищує тепло-, посухо- і холодостійкість рослин, грає важливу роль у процесах росту кореневої системи та листя.

ПЕРЕВАГИ:

- Висока концентрація легкодоступного цинку.
- Швидке та повне проникнення цинку через листок.
- Має позитивний вплив на гормональну систему рослин.
- Забезпечує оптимальний фотосинтез та ріст.
- Сумісне із засобами захисту рослин.

Вміст доступних елементів живлення, г/л:

Азот (N)	120,0
Цинк (Zn)	270,0

Культура	Період (фаза) обробки	Норма, л/га	Кратність обробок*
Кукурудза	5 – 10 листків	0,4 – 0,6	1 – 3
Плодові	До цвітіння, ранній післязбиральний період	0,5 – 1,0	1 – 3

* Мінімальний інтервал між обробками – 7 днів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:



Не перевищувати рекомендовані норми!



Рекомендована норма витрати робочого розчину при позакореновому застосуванні ≥ 150 л/га польових культур та ≥ 800 л/га для плодових культур.



Позакореневе підживлення проводити за температури повітря не вище 25°C та швидкості вітру не вище 5 м/с!



Добриво сумісне з більшістю ЗЗР. Проте при першому застосуванні рекомендується провести тест на сумісність у невеликій кількості.



Не використовувати разом з добривами, які містять фосфор!




ADAMA




Рекомендації щодо застосування лінійки Scudero® на ріпаку

На схемі наведено періоди, в які рекомендується застосування добрив незалежно від наявності дефіциту. За наявності/прояву дефіциту відповідних елементів живлення в інші періоди (фази) росту рослин рекомендується провести позакореневі обробки відповідними продуктами, не прив'язуючись до вказаних періодів (фаз).




Рекомендації щодо застосування лінійки Scudero® на зернових

На схемі наведено періоди, в які рекомендується застосування добрив незалежно від наявності дефіциту. За наявності/прояву дефіциту відповідних елементів живлення в інші періоди (фази) росту рослин рекомендується провести позакореневі обробки відповідними продуктами, не прив'язуючись до вказаних періодів (фаз).




Рекомендації щодо застосування лінійки Scudero® на сої

На схемі наведено періоди, в які рекомендується застосування добрив незалежно від наявності дефіциту. За наявності/прояву дефіциту відповідних елементів живлення в інші періоди (фази) росту рослин рекомендується провести позакореневі обробки відповідними продуктами, не прив'язуючись до вказаних періодів (фаз).



Рекомендації щодо застосування лінійки Scudero® на кукурудзі


На схемі наведено періоди, в які рекомендується застосування добрив незалежно від наявності дефіциту. За наявності/прояву дефіциту відповідних елементів живлення в інші періоди (фази) росту рослин рекомендується провести позакореневі обробки відповідними продуктами, не прив'язуючись до вказаних періодів (фаз).



* Наведена практика світового досвіду.

Рекомендації щодо застосування лінійки Scudero[®] на соняшники

На схемі наведено періоди, в які рекомендується застосування добрив незалежно від наявності дефіциту. За наявності/прояву дефіциту відповідних елементів живлення в інші періоди (фази) росту рослин рекомендується провести позакореневі обробки відповідними продуктами, не прив'язуючись до вказаних періодів (фаз).





ADAMA

Рекомендації щодо застосування лінійки Scudero® на буряку

На схемі наведено періоди, в які рекомендується застосування добрив незалежно від наявності дефіциту. За наявності/прояву дефіциту відповідних елементів живлення в інші періоди (фази) росту рослин рекомендується провести позакореневі обробки відповідними продуктами, не прив'язуючись до вказаних періодів (фаз).

Забезпечення збалансованого живлення мікроелементами в період інтенсивного наростання листя. Підвищення інтенсивності фотосинтезу.

СКУДЕРО МУЛЬТІ
1,0 – 3,0 л/га

Покращення відтоку асимілянтів із листя до коренеплоду, підвищення його цукристості.


СКУДЕРО БОРОН
1,0 – 2,0 л/га

Профілактика «дуплистості» коренеплоду. Позитивний вплив на диференціацію меристемних клітин.

СКУДЕРО БОРОН
1,0 – 2,0 л/га

Забезпечує збалансоване живлення рослин при недостатньому кореновому живленні. Поліпшує ростові процеси, сприяє підвищенню стресостійкості рослин.


СКУДЕРО 6-25-25*
1,0 – 4,0 л/га



* Досвід використання в інших країнах.

Рекомендації щодо застосування лінійки Scudero® на картоплі

На схемі наведено періоди, в які рекомендується застосування добрив незалежно від наявності дефіциту. За наявності/прояву дефіциту відповідних елементів живлення в інші періоди (фази) росту рослин рекомендується провести позакореневі обробки відповідними продуктами, не прив'язуючись до вказаних періодів (фаз).



* Досвід використання в інших країнах.

Рекомендації щодо застосування лінійки Scudero® на томатах, перці, баклажанах

На схемі наведено періоди, в які рекомендується застосування добрив незалежно від наявності дефіциту. За наявності/прояву дефіциту відповідних елементів живлення в інші періоди (фази) росту рослин рекомендується провести позакореневі обробки відповідними продуктами, не прив'язуючись до вказаних періодів (фаз).

Покращення азотного обміну та білкового синтезу рослин у період інтенсивного росту. Підвищення інтенсивності фотосинтезу. Профілактика та усунення хлорозу.

СКУДЕРО МУЛЬТІ
1,0 – 4,0 л/га

Запобігання утворенню верхівкової гнилі. 3 – 6 обробок (мінімальний інтервал між обробками – 7 днів).


СКУДЕРО CaB
3,0 – 5,0 л/га

Поліпшення розвитку квітки та запліднення.

СКУДЕРО БОРОН
1,0 – 2,0 л/га

Забезпечує збалансоване живлення рослин. Поліпшує ростові процеси. Сприяє підвищенню стресостійкості рослин.


СКУДЕРО 6-25-25*
1,0 – 4,0 л/га



* Досвід використання в інших країнах.


Рекомендації щодо застосування лінійки Scudero® на цибулі

На схемі наведено періоди, в які рекомендується застосування добрив незалежно від наявності дефіциту. За наявності/прояву дефіциту відповідних елементів живлення в інші періоди (фази) росту рослин рекомендується провести позакореневі обробки відповідними продуктами, не прив'язуючись до вказаних періодів (фаз).




Рекомендації щодо застосування лінійки Scudero® на винограді

На схемі наведено періоди, в які рекомендується застосування добрив незалежно від наявності дефіциту. За наявності/прояву дефіциту відповідних елементів живлення в інші періоди (фази) росту рослин рекомендується провести позакореневі обробки відповідними продуктами, не прив'язуючись до вказаних періодів (фаз).




Рекомендації щодо застосування лінійки Scudero® на плодових культурах (на прикладі яблуні)

На схемі наведено періоди, в які рекомендується застосування добрив незалежно від наявності дефіциту. За наявності/прояву дефіциту відповідних елементів живлення в інші періоди (фази) росту рослин рекомендується провести позакореневі обробки відповідними продуктами, не прив'язуючись до вказаних періодів (фаз).



Рекомендації щодо застосування лінійки Scudero® на кісточкових плодових культурах

На схемі наведено періоди, в які рекомендується застосування добрив незалежно від наявності дефіциту. За наявності/прояву дефіциту відповідних елементів живлення в інші періоди (фази) росту рослин рекомендується провести позакореневі обробки відповідними продуктами, не прив'язуючись до вказаних періодів (фаз).



ТОВ «Адама Україна»

Центральний офіс

04050, м. Київ |
БЦ «Форум Ділове Містечко» |
вул. М. Пимоненка, 13 |
корпус 4 | офіс 4А/41 |

Комерційні питання

(050) 388 47 56
(050) 564 83 14

Технічні питання

(050) 448 83 02 Польові культури
(050) 309 76 99 Сади
(050) 313 86 40 Картопля

Відділ по роботі

з ключовими клієнтами

(050) 442 48 21 Керівник відділу
(050) 441 69 41 Центр
(050) 383 25 85 Центр
(050) 337 32 26 Захід
(050) 361 61 01 Захід
(050) 021 25 73 Схід
(050) 378 23 20 Схід
(050) 411 18 65 Південь

www.adama.com/ukraine |
www.facebook.com/adamaukraine

Регіональні представництва:

Регіон Вінниця – Хмельницький

(050) 419 50 26 Керівник регіону
(066) 090 19 67 Вінницька обл.
(095) 840 32 02 Вінницька обл.
(095) 840 32 05 Хмельницька обл.
(095) 278 36 34 Техпідтримка (Вінницька обл.)
(050) 454 03 37 Техпідтримка (Хмельницька обл.)

Регіон Запоріжжя – Донецьк

(050) 580 25 11 Керівник регіону
(050) 829 60 65 Запорізька обл.
(050) 750 00 69 Донецька обл.
(050) 388 20 04 Техпідтримка (Запорізька, Донецька обл.)
(050) 435 84 65 Техпідтримка (Донецька обл.)

Регіон Київ – Житомир

(095) 271 79 38 Керівник регіону
(050) 410 44 23 Київська обл.
(050) 634 41 06 Житомирська обл.
(050) 393 52 29 Житомирська обл.
(050) 449 98 60 Техпідтримка (Житомирська, Київська обл.)
(050) 490 77 18 Техпідтримка (Київська обл.)

Регіон Львів – Закарпаття – Волинь – Рівне

(050) 440 33 07 Керівник регіону
(050) 383 25 65 Львівська обл.
(050) 735 40 41 Львівська обл.
(095) 100 35 05 Закарпатська обл.
(050) 302 85 16 Волинська обл.
(050) 410 84 10 Рівненська обл.
(050) 441 68 66 Техпідтримка (Львівська, Закарпатська обл.)
(095) 285 77 95 Техпідтримка (Рівненська, Волинська обл.)

Регіон Полтава – Дніпро

(050) 318 53 81 Керівник регіону
(095) 280 81 12 Дніпропетровська обл.
(066) 670 38 54 Дніпропетровська обл.
(050) 950 33 73 Дніпропетровська обл.
(050) 339 03 85 Полтавська обл.
(099) 636 18 74 Техпідтримка (Полтавська обл.)
(050) 435 84 65 Техпідтримка (Дніпропетровська обл.)

Регіон Одеса – Миколаїв

(095) 326 78 83 Керівник регіону
(050) 100 05 77 Одеська обл. (північ)
(050) 422 80 77 Одеська обл.
(050) 388 77 85 Одеська обл.
(050) 313 76 30 Миколаївська обл.
(050) 334 58 89 Техпідтримка (Одеська обл.)
(050) 423 00 18 Техпідтримка (Одеська обл.)
(050) 956 36 86 Техпідтримка (Миколаївська обл.)

Регіон Тернопіль – Івано-Франківськ – Чернівці

(050) 203 98 78 Керівник регіону
(050) 513 35 75 Тернопільська обл.
(050) 082 32 65 Івано-Франківська обл.
(050) 432 77 48 Чернівецька обл.
(050) 347 00 03 Техпідтримка (Тернопільська, Івано-Франківська обл.)

Регіон Харків – Луганськ

(095) 284 64 84 Керівник регіону
(050) 941 35 20 Харківська обл.
(050) 982 22 58 Харківська обл.
(050) 339 03 59 Луганська обл.
(050) 100 57 96 Техпідтримка (Харківська, Луганська обл.)

Регіон Херсон – Крим

(050) 420 18 81 Керівник регіону
(095) 912 63 73 Херсонська обл.
(067) 533 36 44 Херсонська обл.
(050) 956 36 86 Техпідтримка (Херсонська обл.)

Регіон Черкаси – Кропивницький

(050) 355 99 17 Керівник регіону
(050) 499 32 39 Черкаська обл.
(099) 070 08 57 Черкаська обл.
(050) 521 46 82 Кіровоградська обл.
(066) 566 75 29 Кіровоградська обл.
(095) 697 53 91 Техпідтримка (Черкаська обл.)
(099) 550 29 88 Техпідтримка (Кіровоградська обл.)

Регіон Чернігів – Суми

(050) 332 78 49 Керівник регіону
(050) 435 82 86 Чернігівська обл.
(050) 353 77 17 Техпідтримка (Сумська обл.)
(050) 490 77 18 Техпідтримка (Чернігівська обл.)