

CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT L'ETIQUETTE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Stockage

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et des boissons y compris ceux pour animaux.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

Eviter de manger, boire ou fumer pendant l'application.

Eviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation.

Porter un vêtement approprié, des gants et un appareil de protection du visage.

Eviter le contact avec la peau ou les yeux.

Toxique pour les poissons

Ne pas utiliser à moins de 50 m d'un point d'eau.

Après emploi

Se laver à l'eau et au savon et changer de vêtements.

Bien rincer le matériel de pulvérisation.

Destruction des emballages vides

Brûler, percer ou enfouir dans le sol les emballages vides pour éviter leur réutilisation.

En cas d'ingestion, ne pas provoquer le vomissement, consulter immédiatement un médecin avec l'emballage muni de cette étiquette.

HERBICIDE

ACTIVUS™

500 EC

500 g/l de PENDIMETHALINE

Herbicide de pré-levée.

Cultures: Maïs, Riz,
Maraîchers et Légumineuses



Net: 625ml.

N d'homologation : 0509-A1/He/07-12/APV-SAHEL		
N° de lot:	Date de Fabrication:	Date de péremption:
		2 ans à compter de la date de fabrication
Distribué par: Comptoir 2000/Ets Issa Mory DEMBELE BP 2336, Bamako, Mali Tel/Fax : (223) 2021 36 43		Fabriqué par: ADAMA AGAN Ltd. Northern Industrial Zone P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel
Makhteshim Agan West Africa Ltd, Burkina Faso 01 BP 1495 Bobo Dioulasso 01 Burkina Faso.		

UTILISATION

ACTIVUS 500 EC est un herbicide de pré-levée utilisé pour lutter contre la plupart des graminées et dicotylédones en culture de maïs, riz, cotonnier, maraîchers et légumineuses.

Mode d'emploi

La surface du sol à traiter (labouré ou non) doit être régulière, sans grosses mottes, dépourvue d'adventices levées et de débris végétaux.

Les semences doivent être semées à une profondeur d'au moins 3 cm et couvertes de terre.

Pour toutes les cultures à semis direct (maïs, riz, coton, légumineuses), ACTIVUS 500 EC est appliqué dans les 24 heures suivant le semis avant la levée de la culture et des mauvaises herbes.

Riz irrigué: traiter 1 à 2 jours avant ou après repiquage.

DOSES D'APPLICATION : 2,5 L /HA

Techniques d'application

Pulvérisation bas - volume :

utiliser des pulvérisateurs à dos de 15 à 20 litres pour traiter 60 à 80 litres de bouillie à l'hectare.

Pulvérisation classique :

à l'aide de pulvérisateurs tractés pour traiter 200 à 1000 litres de bouillie à l'hectare.

N.B. Bouillie = mélange produit plus eau.



ATTENTION

