

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- * Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant l'utilisation.
- * Tenir à l'écart des denrées alimentaires.
- * Tenir hors de portée des enfants.
- * Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation.
- * Éviter tout contact prolongé avec les yeux et la peau.
- * Après le traitement, se laver soigneusement avec de l'eau et du savon.
- * Après utilisation, détruire les emballages vides.

GARANTIE

Nos indications d'emploi ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation au cas particulier de tout traitement est laissé au compte de l'utilisateur.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation, eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à nos contrôles.

Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes à la formule indiquée sur l'emballage.

ANTIDOTE

Pas d'antidote. Traitement symptomatique.

HERBICIDE

Diurex™

800 SC

800 g/l Diuron

Herbicide de
pré-levée

Culture: Cotonnier

250ml.

N°. D'HOMOLOGATION: 12 1131 He

Distribué par:
AF-CHEM SOFACO
Tél : +225 21 25 23 61
30 BP 674 Abidjan 30
Côte d'Ivoire



ADAMA



DIUREX 800 SC est un herbicide anti germination à effet résiduel. Il empêche la germination des mauvaises herbes.

DIUREX 800 SC assure en outre un bon contrôle des jeunes adventices par absorption racinaire.

DIUREX 800 SC présente une tolérance physiologique vis-à-vis de nombreuses cultures : cotonnier, anacardier, hévéa, palmier, caféier, cacaoyer, igname, etc.

UTILISATION

DIUREX 800 SC s'applique à l'aide d'un pulvérisateur à dos, juste après le semis du coton ou au plus tard le lendemain sur un sol propre, bien labouré et humide. L'humidité du sol au moment du traitement renforce l'efficacité du DIUREX 800 SC.

DOSES D'APPLICATION

0,75 à 1 L/ha

187,5 à 250 ml + 15 L d'eau/0,25 ha

N° de lot:

Date de Fabrication:

Date de péremption: 2 ans à compter de la date de fabrication



ATTENTION



Fabriqué par:
Adama Agan Ltd
Northen Industrial Zone,
P. O. Box 262,
Ashdod 77102, Israël

Distribué par:
AF-CHEM SOFACO
Tél :+225 21 25 23 61
30 BP 674 Abidjan 30
Côte d'Ivoire

HERBICIDE

Diurex™ 800 SC

800 g/l Diuron

Herbicide de pré-levée

Culture: Cotonnier



ADAMA

N° de lot:

Date de Fabrication:

Date de péremption:
2 ans à compter de la date de fabrication

N°. D'HOMOLOGATION: 12 1131 He

48X250ml



ATTENTION



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- * Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant l'utilisation.
- * Tenir à l'écart des denrées alimentaires.
- * Tenir hors de portée des enfants.
- * Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation.
- * Éviter tout contact prolongé avec les yeux et la peau.
- * Après le traitement, se laver soigneusement avec de l'eau et du savon.
- * Après utilisation, détruire les emballages vides.

GARANTIE

Nos indications d'emploi ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation au cas particulier de tout traitement est laissé au compte de l'utilisateur.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation, eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à nos contrôles.

Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes à la formule indiquée sur l'emballage.

ANTIDOTE

Pas d'antidote. Traitement symptomatique.

HERBICIDE

Diurex™

800 SC

800 g/l Diuron

Herbicide de pré-levée

Culture: Cotonnier

1L

N°. D'HOMOLOGATION: 12 1131 He

N° de lot:	
Date de Fabrication:	
Date de péremption: 2 ans à compter de la date de fabrication	

Distribué par:
AF-CHEM SOFACO
Tél : +225 21 25 23 61
30 BP 674 Abidjan 30. Côte d'Ivoire

Fabriqué par:
Adama Agan Ltd
Northen Industrial Zone, P. O. Box 262,
Ashdod 77102, Israël



ADAMA



DIUREX 800 SC est un herbicide anti germination à effet résiduel. Il empêche la germination des mauvaises herbes.

DIUREX 800 SC assure en outre un bon contrôle des jeunes adventices par absorption racinaire.

DIUREX 800 SC présente une tolérance physiologique vis-à-vis de nombreuses cultures : cotonnier, anacardier, hévéa, palmier, caféier, cacaoyer, igname, etc.

UTILISATION

DIUREX 800 SC s'applique à l'aide d'un pulvérisateur à dos, juste après le semis du coton ou au plus tard le lendemain sur un sol propre, bien labouré et humide. L'humidité du sol au moment du traitement renforce l'efficacité du DIUREX 800 SC.

DOSES D'APPLICATION

0,75 à 1 L/ha

187,5 à 250 ml + 15 L d'eau/0,25 ha



ATTENTION



HERBICIDE

Diurex™ 800 SC

800 g/l Diuron

Herbicide de pré-levée

Culture: Cotonnier



N°. D'HOMOLOGATION: 12 1131 He

N° de lot:

Date de Fabrication:

Date de péremption: 2 ans à compter de la date de fabrication

Fabriqué par:

Adama Agan Ltd

Northern Industrial Zone, P. O. Box 262,
Ashdod 77102, Israël

Distribué par:

AF-CHEM SOFACO

Tél : +225 21 25 23 61

30 BP 674 Abidjan 30. Côte d'Ivoire

12x1L



THIS WAY UP!



ADAMA

Herbicide de pré-levée.
Diurex™ 800 SC

Fabriqué par:
Adama Agan Ltd
Northen Industrial Zone,
P. O. Box 262,
Ashdod 77102, Israël

Distribué par:
AF-CHEM SOFACO
Tél :+225 21 25 23 61
30 BP 674 Abidjan 30.
Côte d'Ivoire

N°. D'HOMOLOGATION:
12 1131 He

Date de Fabrication:

Date de péremption:
2 ans à compter de la date de fabrication

200L

HERBICIDE

Diurex™
800 SC

800 g/l Diuron



Herbicide de pré-



ADAMA

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- * Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant l'utilisation.
- * Tenir à l'écart des denrées alimentaires.
- * Tenir hors de portée des enfants.
- * Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation.
- * Éviter tout contact prolongé avec les yeux et la peau.
- * Après le traitement, se laver soigneusement avec de l'eau et du savon.
- * Après utilisation, détruire les emballages vides.

GARANTIE

Nos indications d'emploi ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation au cas particulier de tout traitement est laissé au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation, eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à nos contrôles. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes à la formule indiquée sur l'emballage.

ANTIDOTE

Pas d'antidote. Traitement symptomatique.

Culture: Cotonnier



ATTENTION

