

INSECTICIDE

YasmineTM


19.2 EC

Emamectine Benzoate 19,2 g/l EC

Extremement actif sur les chenilles
carpophages exocarpiques.
Agit par contact et ingestion, est

Effective for the control of
carpophagous and exocarpic cotton
worms.
It acts by contact and ingestion.

Culture: Cotonnier.
Crops: Cotton.



5L



Fabriqué par:
Adama Makhteshim Ltd,
P. O. Box 60, Industrial Zone,
Beer Sheva 84100, Israel.
Tel/Fax: +972-3-6106666



Distributor/Distributeur:
Société de Louis Dreyfus
Commodities
ZI de Bonaberi, BP. 2368 DOUALA
Phone N°: 33399116
Télécopie: 33391639

Lot n°/Batch No.
Date de Fabrication/ Date of Manufacture:
Date de péremption/Expiry date
Two years from date of manufacturing 2 ans à partir de la date de fabrication
Registration /Homologation n°:
567/10/IN/HOMO/CNHPCAT/CMR.
INSECTICIDE CNPC-CAMEROUN 2015/2016. UTILISATION STRICTEMENT INTERNE. VENTE INTERDITE

CLASSIFICATION TOXICOLOGIQUE:
Classe II (Modérément dangereux)
TOXICOLOGICAL CLASSIFICATION:
Class II (Moderately hazardous).



MODE D'ACTION: Insecticide de la famille des avermectines, le **YASMINE 19.2 EC** qui agit par contact et ingestion, est extrêmement actif sur les chenilles carphophages exocarpiques. Il est non systémique, mais pénètre à travers les tissus végétaux par voie translaminaire. Son activité inhibe l'alimentation du feuillage par l'insecte et apporte un effet résiduel de 7 à 10 jours. Il est recommandé en début de cycle du cotonnier, et particulièrement dans les programmes de lutte contre les résistances des chenilles carphophages du cotonnier aux pyréthroïdes.

MÉTHODE D'APPLICATION: Application à l'aide d'appareil à disque portable à main épandant 10 L de mélange produit-eau à l'hectare (TBV10L/ha).

Préparation de la bouillie: Verser la dose dans le réservoir de l'appareil de pulvérisation à moitié rempli d'eau, puis après agitation, compléter avec de l'eau claire.

Dose d'utilisation: 520 ml de produit par hectare. Soit 260 ml pour un demi hectare et 5 litres d'eau (1 corde).

Période d'application: Appliquez aux heures fraîches du jour, et en absence de vent fort.

Fréquence d'application: Traitement à 14 jours d'intervalle à partir du 45ème jour après levée. Se référer aux recommandations données par l'encadrement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI: Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application. Tenir à l'écart des denrées alimentaires et hors de portée des enfants. Conserver le produit dans son emballage d'origine et fermé. Eviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter des vêtements de protection. Ne pas respirer le nuage de pulvérisation. Ne pas traiter contre le vent. Après utilisation, détruire les emballages vides et les enfouir. Ne pas les réutiliser. Se laver soigneusement avec de l'eau et du savon après le traitement

CLASSIFICATION TOXICOLOGIQUE: Classe II (Modérément dangereux)

CONSEILS: Irritation possible de la peau et des yeux. Utilisation du produit loin des zones apicoles.

ANTIDOTE: Pas d'antidote spécifique connu. Traitement symptomatique.

NATURE AND MODE OF ACTION: **YASMINE 19.2 EC** is an insecticide of the Avermectin family. It acts by contact and ingestion. It is very effective for the control of carphagous and exocaric cotton worms. **YASMINE 19.2 EC** is not systemic, but translaminary penetrating through the leaves. Its translaminary activity against foliage feeding insects provides residual activity for 7 to 10 days. It is advisable to use **YASMINE 19.2 EC** at the beginning of the cotton season to control pyrethroid-resistant strains of carphagous worms on the crop.

APPLICATION METHOD: Apply with a CDA sprayer, which can spray at very low volume (VLV10 l/ha).

Mixing instructions: Fill the spray tank with half the required amount of clean water. Add the required amount of **YASMINE 19.2 EC** and gently shake the machine to facilitate thorough mixing. Top up with water to the required level and shake the machine again.

Dosage: The rate is 520 ml /ha, i.e. 260 ml for half of an hectare, and 5 liters of water.

Application period: Apply during the early hours of the day and avoid strong wind.

Frequency of application: Do the first application 45 days after the emergence of the crop. Repeat application at 14-day intervals. Please follow the recommendations of the cotton officers.

SAFETY PRECAUTIONS: Do not eat, drink or smoke during the application. Keep out of reach of children, food and feedstuffs. Possible irritant to skin and eyes; wear protective clothing and gloves to avoid contact with skin or eyes. Do not inhale the **YASMINE 19.2 EC** spray. Do not spray against the wind. After handling, store left-over **YASMINE 19.2 EC** in its original container and keep under lock. Wash the spraying machine, clothing and body thoroughly with soap and water. Do not re-use empty containers; destroy and bury them away from water bodies. The product must not be used near bee-keeping areas.

Antidote: There is no known specific antidote; treat symptomatically and give supportive therapy.

Toxicological classification: Class II (Moderately hazardous).

INSECTICIDE CNPC-CAMEROUN 2015/2016. UTILISATION STRICTEMENT INTERNE. VENTE INTERDITE

