



ADAMA

FOLPAN^{MD} 80 WDG

Un fongicide granulaire dispersible dans l'eau qui offre une protection exceptionnelle contre les maladies les plus courantes et les plus dommageables pour l'économie dans les vignes et autres cultures fruitières, maraîchères et ornementales.



FONGICIDES

Matière active :

Folpet

Groupe de fongicides :

Groupe M

Formulation :

80 % Folpet = SC

Doses d'application et format :

0,5 à 2 kg/acre
2,5 à 10 acres/sachet
5 à 20 acres par caisse

2 sachets de 5 kg /caisse

CULTURES HOMOLOGUÉES :

- Azalées
- Chrysanthèmes
- Citrouilles
- Concombres de grande culture
- Canneberges
- Courges
- Fraises
- Iris
- Melons
- Muffiers
- OEillets des fleuristes
- Poinsettias (de serre)
- Pommes
- Pommettes
- Raisins
- Tagètes
- Tomates de plein champ
- Zinnias

PRINCIPALES MALADIES SUPPRIMÉES :

- Alternariose
- Anthracnose
- Excoriose
- Mildiou
- Moucheture
- Oïdium blanc
- Pourriture de la tige
- Pourriture du fruit
- Pourriture noire, brune et grise
- Pourridié pythien
- Tache des feuilles
- Tache des feuilles (Didymellina)
- Tache de suie
- Tache phoméenne
- Tache septorienne
- Tavelure

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?

Le produit agit par contact multisite et est doté d'une capacité protectrice. Utiliser FOLPAN^{MD} 80 WDF régulièrement. dans le cadre d'un programme de protection établi.

MOMENT D'APPLICATION ET STADE DES CULTURES :

- **Pommes, pommettes** : Appliquer dans le cadre d'un programme de protection régulier, à partir du stade du bouton vert jusqu'à la récolte. Ne pas faire plus de 6 applications par saison. Consulter l'étiquette pour les précautions supplémentaires.
- **Canneberges** : Appliquer lorsque 5 % des bourgeons floraux sont ouverts. Répéter 10 à 14 jours plus tard lorsque 50 à 75 % des bourgeons sont ouverts.
- **Raisins** :
 - **Excoriose** : Appliquer lorsque les nouvelles pousses mesurent de 1 à 2 po de longueur et répéter lorsqu'elles mesurent de 4 à 6 pouces de hauteur.
 - **Oïdium blanc** : Appliquer dans un mélange en réservoir avec Kumulus^{MD} DF dès l'apparition du mildiou et répéter 10 jours plus tard.
 - **Pourriture noire, mildiou** : Appliquer avant et juste après la floraison et lors du premier traitement postfloral. Pour supprimer le mildiou, un traitement supplémentaire 2 ou 3 semaines plus tard pourrait s'avérer nécessaire.



FOLPAN^{MD} 80 WDG

MOMENT D'APPLICATION ET STADE DES CULTURES (SUITE) :

- **Citrouilles, concombres de grande culture, courges, melons** : Appliquer dès l'apparition des feuilles véritables. Répéter à intervalles de 7 jours jusqu'à la récolte.
- **Tomates de plein champ** : Appliquer pendant la première floraison et répéter à intervalles de 7 jours jusqu'à la récolte.
- **Fraises** : Appliquer avant l'infection initiale et répéter à intervalles de 7 jours jusqu'à la récolte.
- **Azalées, chrysanthèmes, iris, muflers, oeillets, poinsettias, tagètes, zinnias** : De façon générale, appliquer lors de la levée des plantes ornementales et répéter les traitements à intervalles réguliers. Consulter l'étiquette pour connaître le moment d'application spécifique selon la maladie et l'espèce ornementale.

MÉLANGES EN RÉSERVOIR HOMOLOGUÉS ET VALIDÉS :

Les insecticides, les adjuvants et les fongicides les plus couramment utilisés. Vérifier les compatibilités avant de faire des mélanges en réservoir.

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Remplir le réservoir du pulvérisateur presque entièrement et verser la quantité recommandée de FOLPAN^{MD} 80 WDG à la surface de l'eau.
2. Le fongicide peut être prémélangé dans un seau rempli à moitié d'eau. Le mélange peut être versé à travers un tamis dans un réservoir de pulvérisation presque plein.
3. Terminer le remplissage du réservoir.
4. Maintenir l'agitateur en marche pendant le remplissage et la pulvérisation.

ROTATION DES CULTURES :

Aucune restriction

RESTRICTIONS DE PÂTURAGE :

Aucune restriction

ENTREPOSAGE :

Aucune restriction

RÉSISTANCE À L'ENTRAÎNEMENT PAR LA PLUIE :

Aucune restriction

INTERVALLES AVANT RÉCOLTE :

- Canneberges : 30 jours
- Citrouilles, concombres de grande culture, courges, fraises, melons, raisins, tomates de plein champ : 1 jour

CONSEILS PRATIQUES

L'activité fongicide est réduite si elle est associée à des matières fortement alcalines comme la chaux hydratée. Ne pas utiliser en combinaison avec ou à la suite d'une pulvérisation d'huile.



Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette du pesticide.
1.855.264.6262
ADAMA.COM/CANADA/FR

^{MD/MC} FOLPAN est une marque de commerce de ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. Tous les autres produits mentionnés sont des marques de leurs fabricants respectifs.
© 2021 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd.