



ADAMA

THRASHER^{MD}

Offre un excellent double mode d'action pour la suppression de 26 mauvaises herbes à feuilles larges résistantes dans le blé et l'orge.



Matières actives :

Bromoxynil et 2,4-D
(ester 2-éthylhexylique)

Groupes d'herbicides :

Groupe 4
(2,4-D (ester 2-éthylhexylique))
Groupe 6 (bromoxynil)

Formulation :

Ester d'octanoate de bromoxynil 225 g/L et 2,4-D (ester 2-éthylhexylique) 225 g/L = EC

Doses d'application et format :

- 500 mL/acre ou 20 acres/bidon de 10 L
- 2 bidons de 10 L/caisse
- Un baril de 120 L traite 240 acres

CULTURES HOMOLOGUÉES :

- Blé (de printemps)
- Orge

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES :

Stade de 4 feuilles sauf si indiqué :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Abutilon (3 pouces de hauteur) | • Petite herbe à poux |
| • Amarante à racine rouge | • Renouée liseron (8 feuilles) |
| • Amarante résistante à la triazine | • Renouée persicaire |
| • Bardanette | • Sagesse-des-chirurgiens |
| • Bourse-à-pasteur | • Saponaire des vaches |
| • Canola spontané | • Sarrasin (8 feuilles) |
| • Chénopode blanc (8 feuilles) | • Sarrasin de tartarie (8 feuilles) |
| • Kochia à balais
(2 pouces de hauteur 1 à 12 feuilles) | • Séneçon vulgaire (8 feuilles) |
| • Lampourde glouteron | • Sétaire verte |
| • Morelle d'Amérique | • Silène de nuit |
| • Moutarde des champs (8 feuilles) | • Soude roulante (2 à 12 feuilles) |
| • Moutarde sauvage | • Tabouret des champs (8 feuilles) |
| • Persicaire pâle | • Tournesol spontané |

Les mauvaises herbes peuvent être supprimées jusqu'au stade recommandé.

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?

Combinaison d'activité systémique et de contact avec de mauvaises herbes jaunissant en 2 à 4 jours et présentant une croissance anormale (feuilles tordues et coupées) en 2 à 10 jours.

THRASHER^{MD}

STADE DES CULTURES :

4 feuilles jusqu'au début de la feuille étendard.

VOLUME D'EAU :

- Application terrestre : 20 à 40 L/acre
- Application aérienne : 12 à 16 L/acre

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Remplir le réservoir du pulvérisateur à moitié avec de l'eau.
2. Ajouter la quantité requise de THRASHER^{MD} et bien agiter.
3. Remplir le réservoir avec l'eau restante et agiter à nouveau avant utilisation.

ROTATION DES CULTURES :

Aucune restriction l'année suivant l'application

INTERVALLES AVANT RÉCOLTE :

30 jours

RESTRICTIONS DE PÂTURAGE :

- Ne pas permettre au bétail de paître dans les champs dans les 30 jours suite à l'application.
- Ne pas récolter, fourrager ou couper pour le foin dans les 30 jours suite à l'application.
- Retirer les animaux de boucherie des champs traités au moins 3 jours avant l'abattage.

ENTREPOSAGE :

- Se solidifie à des températures inférieures à -20 °C, mais devient utilisable à des températures supérieures à 0 °C.
- Bien agiter avant d'utiliser.

CONSEILS PRATIQUES :

Pour obtenir les meilleurs résultats en cas de couvert végétal important ou lorsque la majorité des mauvaises herbes sont la saponaire des vaches, la renouée ou l'amarante, utiliser des volumes d'eau plus importants. Pulvériser lorsque les mauvaises herbes sont au stade de plantule.

Appliquer dans de bonnes conditions de croissance. L'application doit être effectuée avant que le couvert végétal ne protège les mauvaises herbes.



ADAMA

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette du pesticide.
1.855.264.6262
ADAMA.COM/CANADA/FR

^{MD/MC} THRASHER et BISON sont des marques déposées d'ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd.
Tous les autres produits sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives.
© 2021 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.