



ADAMA

BADGE^{MD}

Obtenez une suppression éprouvée contre près de 30 mauvaises herbes à feuilles larges dans les céréales, le lin et le maïs ainsi que des options de mélange en réservoir faciles à utiliser pour supprimer les mauvaises herbes en un seul passage.



Matières actives :

Bromoxynil et MCPA (ester)

Groupes d'herbicides :

Groupe 4 (MCPA/ester
2-éthylhexyle)

Groupe 6 (bromoxynil)

Formulation :

Bromoxynil 225 g/L
et MCPA (ester)
2-éthylhexyle 225 g/L = EC

Doses d'application et format :

- 0,5 L/acre ou
- 20 acres/bidon de 10 L
- 2 bidons de 10 L/caisse

CULTURES HOMOLOGUÉES :

Grandes cultures :

- Alpiste des canaries
- Avoine
- Blé (de printemps, d'hiver)
- Lin
- Maïs
- Orge
- Seigle d'automne

Plantules de graminées :

- Alpiste roseau
- Agropyre à chaumes rudes
- Agropyre à crête
- Agropyre élevé
- Agropyre intermédiaire
- Brome
- Élime de Russie

- Fléole des prés
- Fétuque rouge traçante
- Fétuque des prés
- Semences de brome des prés
- Semences de fétuque élevée
- Vulpin des prés

MAUVAISES HERBES SUPPRIMÉES :

- Abutilon⁵
- Amarante à racine rouge
- Bardanette
- Bourse-à-pasteur
- Canola spontané (tout type)
- Chardon des champs¹
- Chénopode blanc
- Kochia à balais³
- Laiteron des champs¹

- Lampourde glouteron
- Matricaire inodore⁴
- Morelle d'Amérique
- Moutarde des champs
- Moutarde sauvage
- Petite herbe à poux
- Renouée liseron
- Persicaire pâle
- Renouée persicaire
- Renouée scabre
- Sarrasin

- Sarrasin de tartarie
- Séneçon vulgaire
- Sagesse-des-chirurgiens
- Silène de nuit
- Soude roulante³
- Tabouret des champs
- Tomate sauvage
- Tournesol spontané
- Vélar fausse giroflée

¹ Suppression des parties aériennes

² Jusqu'au stade des 4 feuilles

³ Lorsqu'il est pulvérisé avant que les plantes aient atteint une hauteur de 2 pouces

⁴ Annuelles du printemps seulement

⁵ Lorsqu'il est pulvérisé avant que les plantes aient atteint une hauteur de 3 pouces

BADGE^{MD}

COMMENT LE PRODUIT AGIT-IL ?

Combinaison d'une activité systémique et de contact avec de mauvaises herbes jaunissant en 2 à 4 jours et présentant une croissance anormale (les feuilles tordent et se coupent) en 2 à 10 jours.

STADE DES CULTURES :

Cultures	Stade
Orge, avoine, blé de printemps	2 feuilles à étendard hâtif
Alpiste des canaries	3 à 5 feuilles
Maïs	4 à 6 feuilles
Seigle d'automne	Quand la croissance commence au printemps jusqu'au début de la feuille étendard
Lin, solin	2 pouces au début du stade de bourgeon Meilleure tolérance lorsque le lin a une hauteur de 2 à 4 pouces
Plantules de graminées	2 à 4 feuilles
Fléole des prés (établie pour la production de semences)	Avant le gonflement de l'année de production des semences
Blé d'hiver	Stade 2 à 4 feuilles à l'automne ou après la reprise de la croissance jusqu'au début de la feuille étendard

VOLUME D'EAU :

Application terrestre :

- 20 à 40 L/acre dans les céréales et le lin
- 80 à 120 L/acre dans le maïs
- 60 L/acre dans les fourrages

Application aérienne : 8 à 20 L/acre

MÉLANGES EN RÉSERVOIR HOMOLOGUÉS ET VALIDÉS :

- Maïs : Atrazine
- Lin et solin : ARROW^{MD} 240 EC, ARROW ALL IN ^{MC} ou Poast^{MD}
- Avoine : MCPA (ester)
- Blé de printemps et orge : Avenge^{MD}, MCPA (ester), Refine Extra^{MD}, BISON^{MD} 400
- Blé d'hiver : Refine Extra^{MD}

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Remplir le réservoir de pulvérisation propre à moitié avec de l'eau.
2. Ajouter la dose appropriée de BADGE^{MD} et bien agiter.
3. Remplir le réservoir et agiter à nouveau avant l'utilisation.
4. Lors du mélange en réservoir, suivre les instructions indiquées sur les deux étiquettes.

RÉSISTANCE À L'ENTRAÎNEMENT PAR LA PLUIE :

1 heure

ROTATION DES CULTURES :

Aucune restriction de remise en culture l'année suivant le traitement.

INTERVALLES AVANT RÉCOLTE :

Lin ou solin : 60 jours

ENTREPOSAGE :

Éviter la congélation.

RESTRICTIONS DE PÂTURAGE :

- Ne pas faire paître les céréales traitées ou les cultures de fléole des prés établies ni les couper pour l'alimentation animale dans les 30 jours suivant l'application.
- Ne pas faire paître la sétaire des prés pendant l'année du traitement.
- Ne pas faire paître les autres herbes fourragères traitées dans les 56 jours suivant le traitement.

CONSEILS PRATIQUES :

L'herbicide BADGE^{MD} est bien connu pour être doux sur les cultures. Éviter de pulvériser si les températures sont supérieures à 25 °C.



ADAMA

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette du pesticide.
1.855.264.6262
ADAMA.COM/CANADA/FR

^{MD/MC} ARROW, ARROW ALL IN, BADGE et BISON sont des marques déposées d'ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltd. Tous les autres produits sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives. © 2021 ADAMA Agricultural Solutions Canada Ltée.